SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING


Västra Ringsjön
Östra Ringsjön
Fulltofta naturreservat
Sätoftasjön
Stanstorp
Skeahus
Gamla Bo
Kungshult
Hörby
Ringsöstrand
Ö Vemmerlöv
Ö Strö
Ö Hörvan
Ö Vedskog
Ö Vedaka
Ö Vallsjö
Ö Kärrestorp
Ö Sallerup
Ö Tågarp
Ö Tollarp
Ö Tårby
Ö Fränninge
Ö Vemmenhög
Ö Hammarlunda
Ö Revinge
Ö Revingeby
Ö Hurva
Ö Hurvasjön
Ö Hurvaholm
Ö Hurvaholm
Ö Hurvaholm



Inom det siluriska utbredningsområdet förekommer de underkambriska lagren på stort djup, under yngre paleozoisk berggrund. Ytnära förekomster är påvisade i området mellan Lyby (8c) och Söderto (7c) och i området söder om Henset (7e). Underkambrisk sandsten är också påvisad i en brunnsborrning vid Tångelsås (Berggrundskartan Malmö 2C NO, AI 192) under mellankambrisk alunskiffer.

Sandstenen är vanligtvis inte lika omvandlad som i andra delar av Skåne. I borrkax från brunnsborrningar kan den underkambriska sandstenen påminna om underjurassisk Höörsandsten. Avsaknad av fossil och organiskt material samt förekomsten av grävspår och glaukonit i den underkambriska sandstenen utgör de viktigaste särskiljande karaktärerna.

Information från brunnsborrningar, diksegrävningar och tidigare blottad berggrund gör att den underkambriska sandstenens utbredning i Lyby–Söderto-området (7–8c) är relativt väldokumenterad. Lagerserien stupar här 10–15° åt sydost och sandstenen överlagras successivt av yngre berggrundsenheter i samma riktning. Dess utbredning i Hensetområdet är i avsaknad av blottningar baserad på terrängformer, den rika förekomsten av sandstensblock och observationer i gråvida brunnar. Sandstenen är här troligtvis enbart ett fåtal meter mäktig. Förekomsten utgör en distal del av ett större kambriskt berggrundsområde som breder ut sig åt sydost mot Andrarum.

De underkambriska formationerna överlagras av den 60–80 m mäktiga mellankambriska–underordoviciska Alunskifferformationen (Buchart m.fl. 1997). Den består av svart alunskiffer, tunna kalkstensbankar och orstenar. Formationen utgör den yntära berggrunden inom en smal zon som löper parallellt med och sydost om den underkambriska sandstenens utbredningsområde i Lyby–Söderto (7–8c) samt i ett smalt stråk utmed Fyledalens förkastningszon vid Tångelsås (6a). Den sistnämnda förekomsten har tidigare varit okänd. Förekomsten är troligtvis ett resultat av rörelserna i Fyledalens förkastningszon som medför att äldre berggrund uppförkastats. Liknande förekomster kan finnas utmed förkastningszonen mellan Harlösa (5b) och Kristinetorp (6a). I SGUs undersökningsborrning vid Lyby mosse (8c) påträffades alunskiffer på 35 m djup, underlagrande underordovicisk Komstadkalksten och övre Didymograptusskiffer.

Ordovicium

Ordovicisk berggrund yngre än Alunskifferformationen utgör den yntära berggrunden inom en smal zon från Sebbarp (7c) mot Raby (8c). Förekomsten är påvisad i ett fåtal brunnsborrningar och i undersökningsborrningen vid Lyby mosse. Den ordoviciska lagerföljden i Skåne inleds med Dictyonemaskiffer som tillhör Alunskifferformationen, följt av Ceratopygelager (kalksten och lerskiffer), Tøyenskiffer och Komstadkalksten. Resterande delar av ordovicium består av grå lerskiffer med kalkstensband (övre Didymograptusskiffer och Dicellograptusskiffer) och slamstenar (Jerrestads- och Tommarpsslamstenar). Lagerserien är totalt ca 100–125 m mäktig (Thorshøj Nielsen 1995).

I undersökningsborrningen vid Lyby mosse förekommer övre Didymograptusskiffer ovanpå Komstadkalksten och alunskiffer. Tøyenskiffer och Ceratopygelager saknas. Indikationer på omlagrade Ceratopygelager finns på 35 m djup.

I en borrning vid Fridhem (7c) har gränsen mellan ordovicium och silur påvisats på 37 m djup. I de nedre delarna av borrningen (78–80 m) förekommer flera horisonter med bentonit vilket är karaktäristiskt för de mellanordoviciska lagren.

Silur

Inom ett stråk (Colonusskifferträget) från nordväst till sydost, begränsat av Fyledalens och Kullen–Ringsjön–Andrarums förkastningszoner, består den yntära berggrunden av olika typer av grå och mörkgrå, silurisk lerskiffer. Sandsten, kalksten och märgelsten förekommer framför allt inom Öved–Ramsåsagruppens utbredningsområden. Längs Borstbäcken (5c), Vollsjödan (5e), Harlösabäcken (5b) och i ravinen till Bråån i Röstarekulans naturreservat (7b) finns fina skärningar genom den siluriska skiffern.



Den siluriska berggrunden indelas i fyra större enheter, Rastrites-, Cyrtograptus- och Colonusskiffer samt Öved–Ramsåsagruppen. Lagerföljden är i storleksordningen 1000–1500 m mäktig. En stor del av den totala mäktigheten utgörs av översilurisk Colonusskiffer (Hede 1915). Det är svårt att enbart från brunnsborrningsuppgifter och enstaka blottningar kartlägga de olika skifferenheterna inom kartområdet, eftersom lagerföljden domineras av grå och mörkgrå fossilfattig lerskiffer. Rastrites-, Cyrtograptus- och Colonusskiffer har därför fått samma färg på kartan. Öved–Ramsåsa-gruppens bergarter har däremot fått en egen färgbeteckning.

Undersilurisk berggrund är endast påvisad i en borrning vid Fridhem (7c) sydost om Lyby mosse. Förekomsten av odaterade, svarta skiffrar i borrningar vid Löberöd (6b) indikerar att den yntära berggrunden lokalt kan bestå av undersiluriska skifferenheter. Den asvsvårt mäktigare, överliggande Colonusskiffern domineras av grå, siltig lerskiffer med lager av kalksten, siltsten och slamsten.

Öved–Ramsåsagruppens bergarter representerar de yngsta blottade sedimentära lagren i Skånes paleozoikum. Öved–Ramsåsagruppens bergarter påträffas i två större sammanhängande områden, ett kring Klinta–Pinedalen (8b) och ett mellan Björsjölagård, Skartofta, Öved och Östra Karnstorp (5d). Mindre förekomster är påvisade i brunnsborrningar väster om Östra Sallerup (7d) och nordnordväst om Fräkninge (6e). Lagerserien som indelas i Klintaformationen och den yngre Övedssandstenen består av kalksten, märgelsten, lerskiffer, siltsten och sandsten. De yngsta delarna av Övedssandstenen är ofta kraftigt rödfärgade av hematit. Sandstenen har tidigare brutits som byggnads- och ornamentsten bl.a. vid stenbrotten 1 km öster om Frualid (5d) (Regnéll 1964) och vid Klinta (8b). Sandstenen har bl.a. använts vid byggandet av Övedsklosters slott och senare Grand Hotell i Lund. Klintaformationen indelas i sin tur med hjälp av fossil i Lunnarna-, Bjär-, Björsjö- och Björsjölagårdsleden (Jeppsson & Laufeld 1986). Någon differentiering av de olika underenheterna har inte gjorts på kartan. Vissa delar av Klintaformationen är till skillnad från den underliggande Colonusskiffern mycket fossilrika, exempelvis lagerföljden i Björsjölagårds gamla stenbrott. Vanliga makrofossil är kalkalger, koraller, bryozoer, brachiopoder, krinoideer (sjöliljor), musslor, gastropoder, trilobiter och ostrakoder (Bergman & Stridsberg 1991). Kalksten i Björsjölagård bröts för tillverkning av bränd kalk. Brytningen är sedan 1920-talet nedlagd men ännu finns delar av den gamla kalkugnen bevarad.

Foton som visar exempel på blottningar av silurisk lerskiffer i Brååns dalgång vid Röstarekulan och Öved–Ramsåsalager (Björsjölagårdsledet) i Björsjölagårds nedlagda kalkstensbrott. Foto: A. Damberg.



Siluriska fossil från Björsjölagård och Röstarekulan. A: Graptolit, *Monograptus* sp. (Röstarekulan), B: Trilobit, *Calymene* sp. C: Gastropod, *Platyceras* sp. D: Sjöliljor (stjälkleder). E: Brachiopoder, *Dethyris* sp., *Atrypa* sp. Foto: A. Damberg. Skalstrecket på bilderna motsvarar ca. 1 cm.

YNGRE PALEOZOIKUM

Under devon, karbon och perm tillhörde Skåne ett större sammanhängande höjdområde som utsattes för omfattande erosion. Under perioden var flera av de större förkastningarna aktiva. Under en tas med isåredragande krafter stod sprickorna öppna så att stora mängder diabasmagma kunde tränga in. Detta skedde under karbon–perm. Magman stelnade och bildar nu de talrika gångar av diabas som i ungefär nordvästlig riktning genomdrar Skåne.

Karbonisk sedimentär berggrund är inte påvisad i Skåne men det fanns under jurarperioden rester kvar i närområdet. Detta är påvisat genom rikligförekomst av omlagrade, välbevarade pollen och sporer från karbontiden i juralager i Vombsänkan.

Nordvästdiabaser

Brantstående gångar av permo–karbonisk diabas (ca 294 miljoner år gamla, K-Ar; Klingspor 1976) är knutna till Tornquistzonen och har därför, liksom denna, nordvästlig till sydöstlig orientering. Diabasen har i stort sett samma kemiska egenskaper som den tidigare beskrivna hyperitdiabasen men skiljer sig från denna genom en något ljusare färg, NV-diabasen är aldrig amfibolitomvandlad och i mikroskopet kan man se typiska, mikropegmatitiska sammanväxningar mellan alkalifältspat och kvarts, något som saknas hos hyperitdiabasen. Antalet gångar som observerats i hällblottningar är ganska litet, men med hjälp av den magnetiska anomalikartan där gångarna tydligt framträder, har ett tämligen stort antal magnetiskt indikerade gångar kunnat markeras på berggrundskartan. Vid kontrollmätning på marken med magnetometer har bredden på den mest framträdande, ingmätta, magnetiska anomalien uppmätts till ca 50 m. Sannolikt kan inte gångar smalare än 10–15 m detekteras vid flygmätningen, varför antalet gångar kan vara betydligt större i verkligheten än vad som anges på berggrundskartan. Vid Gammalstorp (9e) uppträder en nordvästdiabas, s.k. kullait, som har svagt rödaktiga stänk av kalifältspat i den mörkgrå färgen.

MESOZOIKUM

Trias

I området väster om Östra Sallerup (7d) överlagras översiluriska Öved–Ramsåsalager av en 25 m mäktig sekvens med gula, gröna och röda osorterade sandiga leror. I några kärnborningar i Hörby, utförda av Höganäs AB 1939 och 1967, samt i en brunnsborrning i Ostholm (8c) underlagras den rät–underjurassiska lagerföljden av en 11–38 m mäktig sekvens med osorterade gula, gröna och röda sandiga leror, sandstenar och arkoser på det prekambriska, vittrade urberget. Lagren är inte daterade, men deras litologiska karaktär överensstämmer väl med vad som karaktäriserar den övertriassiska Kågerödsformationen i Sydvästskåne och väster om Söderåsen (Troedsson 1942).

Ett mera sammanhängande område med förmodade Kågerödslager sträcker sig troligtvis från Ostholm in i Hörbysänkans centrala delar. Utbredningen är osäker eftersom lagren i vissa fall kan förväxlas med kraftigt vittrad prekambrisk berggrund.

Yngsta trias (rät) och jura

I anslutning till och öster om Ringsjöarna samt i Hörbyområdet förekommer i borrningar sandstens-, siltstens- och lerdominerade bergartssekvenser daterade till rät–underjura. Lagren förs litostratigrafiskt till Höörsandstenen (Troedsson 1940). Lagerföljden är vanligtvis ca 30 m mäktig. Lokala avvikelser kan vara betydande, t.ex. vid Lillö (9b) där lagerföljden är hela 126 m mäktig. I Hörby påträffas den enda blottningen med Höörsandsten inom kartområdet. I Starrarps Ora (6e), Åspinge (8e), Bessinge (7e), Romna (7d) och Fränarp (8e) finns ett antal mindre, isolerade förekomster. Vid Kyllinghus (9d) förekommer rikligt med sandstensblock som indikerar nära anstående Höörsandsten. Sannolikt förekommer det fler isolerade rester med rät–underjurassisk berggrund inom kartområdet.

Den egentliga Höörsandstenen utgörs av en undre del bestående av kolhaltiga leror som av Troedsson (1940) förts till Vallåkraledet på grund av litologiska jämförelser. Däröver följer en sekvens med sandstenar indelade i Stanstorpsledet (tidigare Kvarnstenen) följt av Vittserödsledet (tidigare Skellingestenen). Lagerserien är väl dokumenterad i Höörsområdet men kan inte lika väl urskiljas i Hörby-området. Där dominerar siltig och ljusgrå, finkornig sandsten i flertalet brunnsborrningar. Den rät–underjurassiska lagerföljden vilar antingen på vittrat prekambriskt urberg eller i delar av Ostbyholm–Hörbyområdet på brokigt färgade leror och arkoser som troligtvis tillhör Kågerödsformationen.

I Vombsänkan påträffas en sekvens av okländ mäktighet med rät–underjurassisk berggrund samt ospecificerade lager av mellanjurassisk till underkretaceisk ålder överlagrande det prekambriska urberget. Den består av en heterogen lagerföljd med lera, siltsten och sandsten med inslag av kol. Där sekvensen inte utgör den yntära berggrunden överlagras den av den överkretaceiska Vombformationen.

Basalt, melafyr och basalttuff

Inom kartområdet förekommer bevis på jurassisk vulkanism i form av basalt och basalttuff på flera platser, bl.a. vid Höby (8d) och mellan Ringsjöarna (9b). I Skåne har ca 100 vulkanrester från jurarperioden identifierats vilket antyder en betydande magmatisk aktivitet.

Områdets enda egentliga vulkanruin utgörs av den lilla kullen med basaltblock på halvön i Västra Ringsjön vid Lillö (9b). Basalt finns i övrigt blottad på ytterligare ett fyrtal ställen samt påträffad i några brunnsborrningar. Aska från de vulkaniska utbrotten, s.k. tuff, har också påträffats i några borrningar. Basalten är mycket finkornig, gråsvart till svart, ofta med glasig grundmassa. På en del ställen finns centimeterstora inneslutningar av grönaktig olivin. De nämnda basalterna har vid radiometrisk datering (K-Rb) gett åldrarna ca 170 miljoner år resp. 110 miljoner år (Klingspor 1976). Paleomagnetiska undersökningar tyder på jurassisk ålder (Bylund 1973).

Mycket finkornig, amygdaloidal (mandelstensförande) basalt förekommer som gångar, s.k. melafyrgångar framför allt i den södra delen av området. Melafyr förekommer dels som smala, 0,5–10 m breda, brantstående gångar, dels som en ca 250 m bred, mer komplex gång med okländ stupning vid Frualid, öster om Övedskloster (5c). Den senare innehåller varieteter med varierande kemiska och mineralogiska egenskaper, något som noterades redan av Törnebohm & Hennig (1904) och som kan vara tecken på förekomsten av flera gånggenerationer. Vanligen är bergarterna i Frualid starkt rödbruna på vittrade ytor och grå i färskt brott. På en del ställen uppträder ljusa mandlar av kalcit som i allmänhet är 0,5–1 cm stora. Radiometriska dateringar (K-Ar) från Frualid — också från vilken bergartsvarietet — har gett åldrar mellan ca 281 miljoner år och 269 miljoner år (Klingspor 1976), vilket är obetydligt lägre än de ca 294 miljoner år som är åldern på nordvästdiabasen. Någon radiometrisk datering av kartområdets smala, basaltliknande melafyrgångar har hittills inte gjorts. Deras kemiska och mineralogiska egenskaper liknar i hög grad den egentliga, i vulkanruinerna uppträdande, basaltens, varför det är rimligt att uppfatta dem som samhöriga med denna. Detta motsägs dock av radiometriska dateringar (K-Ar) från kartområdet Tomelilla SV (Torpa Klint), som gett åldern 278–255 miljoner år på liknande gångar (Klingspor 1976).

Krita

Kretaceiska bergarter förekommer enbart i de södra delarna av kartområdet där de påträffas i brunnsborrningar under 30–70 m mäktiga kvartära jordlager. I ett fåtal brunnsborrningar, bl.a. söder om Harlösa, utgörs de kretaceiska lagren av karbonatisk, glaukonitisk siltsten och sandsten. Lagren tillhör den överkretaceiska Vombformationen (Ernström 1994).

Förekomsten tillhör de inre delarna av Vombsänkan, vilken är en 7–11 km bred och asymmetrisk sänka som sträcker sig från Krankesjön till Ystad och vidare åt sydost mot Bornholm. Den kretaceiska lagerserien i denna är som mest ca 1100 m mäktig. Inom kartområdet är lagerserien avsevärt tunnare, maximalt troligtvis ett par hundra meter.

TEKTONIK

Områdets geologiska uppbyggnad är resultatet av ett antal stora tektoniska händelser under fanerozoisk tid (Ernström m.fl. 1997). Kartområdet ligger inom ett strukturellt komplext område som kallas Tornquistzonen och som sträcker sig från södra Polen till Nordsjön. Tornquistzonen har varit aktiv under flera perioder sedan paleozoikum och utgör den mest betydelsefulla zonen när det gäller Skånes geologiska historia. Den strukturella uppbyggnaden domineras av nordväst–nordnordvästligt orienterade strukturer vilka här samman med den regionala orienteringen av förkastningszoner och svaghetszoner utmed Baltiska sköldens sydvästra randzon.

Under ordovicium och silur sjönk området successivt mot söder i samband med förstadierna till den kaledoniska orogenesen. De ordoviciska och siluriska lagren ökar markant i mäktighet mellan Skåne och norra Tyskland på grund av detta. I samband med insjunkningen och pålagringen av stora sedimentmäktigheter påverkades området av tension. Detta medförde att vissa av de större förkastningszonerna i Skåne aktiverades, bl.a. Kullen–Ringsjön–Andrarums förkastningszon, vilken även utgör Tornquistzonens norra begränsningslinje.

Under yngre paleozoikum skedde en omfattande erosion samtidigt med tension och uppsprickning vilket ledde till att bl.a. Fyledalens förkastningszon initierades. Sprickzonerna beredde också väg för intrusioner av basisk magma som bildade nordvästligt orienterade och brantstående diabasgångar.

Under äldre perm skedde även horisontella förkastningsrörelser "strike-slip" i jordskorpan till följd av öst–västlig tension och uppsprickning av området runt Tornquistzonen. Rörelserna innebar att området nordost om Tornquistzonen förflyttade sig i sydostlig riktning i förhållande till området sydväst om zonen (dextrala rörelser). Rörelserna är påvisade i Kattegatt (Mogensen 1994), och summan av de laterala rörelserna, som även skedde periodvis under mesozoisk tid, är beräknade till 16–27 km (Mogensen 1994, 1995). I anslutning till dessa rörelser bildades även nordligt och nordostligt orienterade förkastningszoner. Inom kartområdet har inte strike-sliprörelser kunnat identifieras men sannolikt finns inslag av såväl horisontella förkastningsrörelser som nordostliga förkastningszoner i den tektoniska bilden.

Under perioden devon–mellersta trias utgjorde stora delar av Skåne ett upphöjt landområde. Tension i jordskorpan under trias resulterade i en nerförkastning av Colonusskifferträget. I tråget, avgränsat av Fyledalens och Kullen–Ringsjön–Andrarums förkastningszoner, avsattes troligtvis upp till ett par hundra meter röda och gröna, dåligt sorterade sediment (lera, konglomerat och sandsten) motsvarande Kågerödsformationens bergarter. I dag finns enbart rester av dessa bergarter bevarade, eftersom de borteroderades i samband med berggrundsrörelser under yngre krita och tertiär. De äldre paleozoiska bergarterna i Vombsänkan och på Linderödsåsen borteroderades delvis under den här perioden.

Efter en relativt lugn tektonisk period under rät–yngre jura påverkades området på nytt under mellersta jura av magmatisk aktivitet vilket innebar upphöjning och vulkanism i centrala Skåne.

Stora kompressionsrörelser i jordskorpan under yngre krita–paleogen till följd av alpina rörelser i Mellan och Sydeuropa resulterade i en upphöjning (inversion) av Tornquistzonen och en reaktivering av de större förkastningszonerna. Inom kartområdet höjdes hela Colonusskifferträget och utsattes för omfattande erosion. Inversionen skedde troligen i flera olika faser under maastricht–paleogen. Under neogen tid påverkades området ytterligare av erosion till följd av en regional upphöjning av Skandinaviens sydvästkant.

REFERENSER

Ahlberg, P. (ed.), 1998: Guide to excursions in Scania and Västergötland, southern Sweden. IV field conference of the Cambrian Stage subdivision working group. *Lund Publications in Geology 141*, 47 s.

Bergman, C. & Stridsberg, S., 1991: *Svenska fossil i ord och bild. Arlöv*. 110 s.

Buchart, B., Thorhøj Nielsen, A. & Hemmingsen Schovsbo, N., 1997: Alun Skiferen i Skandinavien. *Geologisk Tidskrift 3*, 30 s.

Bylund, G., 1973: Paleomagnetic study of Scanian dolerites and basalts. Geologiska Institutionen, Lunds Universitet, 53 s.

Daniel, E., 1999: Beskrivning till jordartskartan 2D Tomelilla NV. *Sveriges geologiska undersökning Ae 119*, 89 s.

De Geer, G., 1894: Beskrivning till kartbladet Lund. *Sveriges geologiska undersökning Aa 92*, 79 s.

Debon, F. & LeFort, P., 1982: A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. *Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth sciences 73*, 135–149.

Erlström, M., 1994: Evolution of Cretaceous sedimentation in Scania. *Lund Publications in Geology 122*, 37 s.

Erlström, M., Thomas, S.A., Deeks, N. & Sivhed, U., 1997: Structure and tectonic evolution of the Tornquist Zone and adjacent sedimentary basins in Scania and the southern Baltic Sea area. *Tectonophysics 271*, 191–215.

Hamberg, L., 1991: Tidal and seasonal cycles in a Lower Cambrian shallow marine sandstone (Hardeberga Fm.) Scania, Southern Sweden. *In* D.G. Smith, G.E. Reinson, B.A. Zaitlin & R.A. Rahmani (eds.): Clastic Tidal Sedimentology. *Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoir 16*, 255–274.

Hede, J.E., 1915: Skånes Colonusskiffer. *Lunds Universitets Årsskrift 26*, 1–66.

Jeppsson, L. & Laufeld, S., 1986: The Late Silurian Öved–Ramsåsa Group in Skåne, south Sweden. *Sveriges geologiska undersökning Ca 58*, 45 s.

Johansson, L. & Johansson, Å., 1990: Isotope geochemistry and age relationships of mafic intrusions along the Protogine Zone, southern Sweden. *Precambrian Research 48*, 395–414.

Karlsson, V., 1879: Beskrivning till kartbladet Linderöd. *Sveriges geologiska undersökning Aa 68*, 33 s.

Klingspor, I., 1976: Radiometric age-determination of basalts, dolerites and related syenite in Skåne, southern Sweden. *Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 98*, 195–216.

Kornfält, K.-A., Bergström, J., Carserud, L., Henkel, H. & Sundvoll, B., 1978: Beskrivning till berggrundskartan och flygmagnetiska kartan Kristianstad SO. *Sveriges geologiska undersökning Af 121*, 120 s.

Lindström, M., Lundqvist, J. & Lundqvist, T. 1991: *Sveriges geologi från urtid till nutid*. Studentlitteratur. Lund. 398 s.

Mogensen, T.H., 1994: Palaeozoic structural development along the Tornquist Zone, Kattegatt area, Denmark. *Tectonophysics 240*, 191–214.

Mogensen, T.H., 1995: Triassic and Jurassic structural development along the Tornquist Zone, Denmark. *Tectonophysics 252*, 197–220.

Nathorst, A.G., 1885: Beskrivning till kartbladet Trolleholm. *Sveriges geologiska undersökning Aa 87*, 111 s.

Regnéll, G., 1964: Kring Röstarekulan och Helvetesgraven. *Skånes Natur*, 71–82.

Thorshøj Nielsen, A., 1995: Trilobite systematics, biostratigraphy and palaeoecology of the Lower Ordovician Komstad Limestone and Huk Formations, southern Scandinavia. *Fossils and Strata 38*, 374 s.

Troedsson, G., 1940: Om Höörs sandsten. *Geologiska Föreningens i Stockholms Förhandlingar 62*, 245–283.

Troedsson, G., 1942: Bidrag till kännedomen om Kågerödsformationen i Skåne. *Geologiska Föreningens i Stockholms Förhandlingar 64*, 289–328.

Tullberg, S.A., 1882: Beskrivning till kartbladet Övedskloster. *Sveriges geologiska undersökning Aa 86*, 51 s.

Törnebohm, A.E. & Hennig, A., 1904: Beskrivning till blad 1 & 2 omfattande de topografiska kartbladen Landskrona, Lund, Kristianstad, Malmö, Ystad och Simrishamn. *Sveriges geologiska undersökning A1a*, 198 s.

Wikman, H. & Bergström, J., 1987: Beskrivning till provisoriska översiktliga berggrundskartan Malmö. *Sveriges geologiska undersökning Ba 40*, 42 s.

Wikman, H. & Sivhed, U., 1993: Beskrivning till berggrundskartan Kristianstad SV. *Sveriges geologiska undersökning Af 155*, 106 s.

Wikman, H., Bergström, J. & Lidmar-Bergström, K., 1983: Beskrivning till berggrundskartan Helsingborg SO. *Sveriges geologiska undersökning Af 127*, 165 s.

English summary

The map area is dominated by sedimentary rocks. Precambrian rocks are mainly found on the Linderödsåsen horst in the north-eastern part. The map is mainly based on borehole information and aerogeophysical investigations since outcrops are few and of poor quality.

The Precambrian rocks are dominated by orthogneisses, mainly of granitoid origin. Among the gneiss varieties there are a red to greyish red, leucocratic, fine-grained, strongly foliated one. Another variety is fine-grained, reddish grey to greyish red. A third is reddish grey, fine-grained to finely medium-grained with sparse megacrysts of microcline. It is comparatively homogeneous and has as a rule monzogranitic (adamellitic) to granodioritic composition. NE–SW oriented dykes of black dolerite, so-called hyperite dolerite, occur within the Precambrian rocks. These dykes define, together with other features, the Protogine Zone, a major tectonic zone dividing southern Sweden into two bedrock regions.

Palaeozoic rocks are found within the Colonus Shale Trough which crosses the map area in a NW–SE direction. The bedrock surface in the trough is dominated by Silurian, grey, silty shale. Uppermost Silurian sandstone, limestone and marl occur in two main areas west of Östra Ringsjön and in the south-eastern part of the map. Lower Cambrian sandstone, Ordovician limestone and shale constitute the bedrock surface in a small area south-west of Hörby. Lower Cambrian sandstone occurs also as erosional remnants on the Linderödsåsen horst. Within the Colonus Shale Trough these strata subcrop thick Silurian deposits.

During the Carboniferous and Permian periods the older Palaeozoic and Precambrian rocks were intruded by magma along north-west oriented fractures and faults as a result of tension in the crust. Vertical to subvertical up to c. 50 m wide dolerite dykes were formed which constitute a significant feature in the geological setting.

The Upper Triassic Kågeröd Formation is made up by poorly consolidated arkose, sandstone and claystone and is locally found subcropping the Rhaetian–Lower Jurassic deposits in the Hörby area. A small fault-bounded occurrence is also found at the north-eastern margin of the Colonus Shale Trough. This occurrence is likely the remnant of a pre-existing Upper Triassic cover in the trough.

Rhaetian–Lower Jurassic strata has a thin and patchy distribution north-east of the Kullen–Ringsjön–Andrarum Fault Zone. The deposits belonging to the Höör Sandstone are dominated by fine-grained sandstone, siltstone and clay with minor amount of coal.

Undifferentiated Middle Jurassic to Lower Cretaceous siltstone clay and sandstone are found in a few borings in the Vomb Trough. These deposits subcrop to the south-east a few hundred meters thick sequence of calcareous sandstone, siltstone and limestone of the Upper Cretaceous Vomb Formation.

In some places, mainly within the Höör Sandstone, basalt and basaltic tuff layers are found. They are probably Jurassic, but less reliable datings exist which point to a Cretaceous age. Fine-grained, porphyritic basalt is found also as dykes, so-called melaphyre.

The map area lies within the Tornquist Zone which is a regional tectonic zone which has been active during several periods. The most important movement involved an inversion, uplift and erosion of the Colonus Shale Trough during the Late Cretaceous to Neogene.