



Förklaringar:
▲ Ståthög
☆ Stansättning
■ Sinkamuel

Observationspunkt för:
L Mergel
+ Kalkhaltig sand
OO för underlytan

- Mostror
- Torf
- Svämmer
- Svämmerd
- Strandvallar äldre och yngre
- Mosad
- Åkerler
- Hvarfvy ler
- Bultstengrus
- Kvartsstengrus
- Kvartsstenar
- Su
- Su
- Kalksten
- Almskiffer
- Sandsten, skiffer och konglomerat
- Grå gneis
- Röd gneis
- Skiffer och slår
- Granit
- Siktens styrning och stupning (från horisonten)
- Lodrikt stående skikt
- Reffernas riktning
- Jättgryta
- Källa
- Moorskälla
- Stenbrott
- Mossars djup i fot
- Fruktfulla för sövatten-cislar
- Fruktfulla för arktiska växter
- Avvägd punkt
- Avvägd repunkt

Grundskild på Topografiska Örternes utgåvor i skalan 1 : 50,000.
Yttersta drag i ett skikt i enlighet med Kjöpmannens utgåvor.

Förskild i Centralbyråen år 1887.
Skala: 1:50,000. 1 decim. = 1000 fot, 1 centimeter = 100 meter.

Geologiska undersökningen: 6 delar. Blad är utgivet åren 1879-89
af G. Linnarsson, 1887 af G. Holmström och H. F. W. Sjöström.
Revidering verkställd åren 1885-86 af J. Jansson.

