BLADET "BÄCKASKOG" | II. Ö. 40

Geogr. längden är räknad från Stockholms Observatorium beläget 33° 43′ 0″ ö. om Ferro.

(Climåkra) — JEMSHÖGS SOCKEN — (Karlshamn) — NÄSUMS SOCKEN — (Hesslehom) — SÖRBY SN — ÖNNESTADS SOCKEN — NOSABY SOCKEN — NOSABY SN (Kristianstad) FJELKINGE SN — GUALÖFS SOCKEN

Fornlemningar:

- En ättehög
- Två eller flera ättehögar
- Ättehög med rest sten på toppen
- Stenkummel
- Skeppssättning
- Bautasten
- Två eller flera bautastenar
- Hällekista

Höjden öfver hafvet i fot:

- 200 Afrägd punkt (Topografiskarens mätningar)
- 200 „ „ (andra „ „)
- 30 Sjöars djup i fot
- 5 Mossars djup i fot

Observationspunkt för:

- Lermergel
- Kalkhaltigt grus
- (0 fot under jordytan)

Fryggan.

Postglaciala bildningar:
- Mosstorf
- Torfbly
- Grfga.
- Strandgrus
- Svämsand
- Svämlera.
- Mosand
- Strandgrus

Äldre Glaciala bildningar:
- Ilmerälg lera.
- Bollstensgrus
- Svallgrus
- Äskelgrden (sidomoräner)
- Jökelgrus (kroseläsgrus)

Äldsta sedimentbildningar:
- Kb. Ka. Kalksten Kb med Bel. mucronata Ka med Ast. mammillatus
- Glimmerqvartsit med konglomerat (kg)
- Hälleflintgneis med hornblende
- Grå hälleflintgneis
- Grå gneis
- Jerngneis
- Grandfgneis
- Granit
- Pegmatit
- Ceraris
- Dioritskiffer och diorit
- Diabas

- Skiktens streckning och stupning
- Lodrätt stående skikt
- Slingriga och vreiga skikt
- Refformas riktning
- Sättegrytor, glaciala.
- „ „ , marina.
- Källa.
- Mineralkälla.
- Stenbrott.
- Borrhål.
- Järnmalm.
- Kaolin.
- Kyndetälle för sötvattenssnäckor
- „ „ „ rätzlemningar
- „ „ „ vertebrater
- Undervattenskog

Grundadt på Topografiska Kårens mätningar i skalan 1:50000.

Tryckt i Gen. Stabs Litogr. Anstalt år 1889.

Skalan 1:50000 eller 1 dec. tum = 2000 fot, 1 centimeter = 500 meter.

1 Sr. mil. — 10 Kilometer = 1 ny mil.

Geologiska undersökningen å detta blad är utförd 1883–1885 af G. De Geer med biträde af F. Kyrander, K. F. Rägerström, V. Öberg, J. C. Moberg och J. Jönsson, revideringen 1886 af G. De Geer.