


- | | |
|--|---|
| | Mosstorf |
| | Torf |
| | Lera |
| | Sand |
| | grusig och stengig |
| | Sand (svämsand) |
| | Lera |
| | Sand, grusig och stengig |
| | Sandis, rullstensås ell. fält (Markerad åsrygg) |
| | Åf hafvet bearbetad isäfsavlagring + issjö |
| | Morängrus i allmänhet |
| | Moränlera |
| | Åf hafvet ursköjdt morängrus |
| | issjö (Svällgrus, strandgrus) |
| | Blocksamling |
| | Visingsöformationen |
| | Nephelinsyenit (m. allhörande) (Benavert) |
| | Granit |
| | Hyperit och hyperitdiorit |
| | Diorit |
| | Porfyr |
| | Gneis grå |
| | röd |

- Erosionsterass utbildad af sen-glaciala hafvet
- issjö
- Parallellstruktur
- med tydlig stupning
 - ladrät
 - brant
 - flack
 - Refflor
 - Anmärkningsvärdare kalkkälla

Grundade på Generalstabens mätningar i skalan 1:50,000.

Tryckt i Centralityckeriet 1906

Skalan 1:50,000 eller 1 centimeter = 500 meter



Geologiska undersökningen af detta blad är utförd åren 1879, 1900 och 1902 af H.E. Norman; revideringen verkställd 1903 af A. Blomberg.