SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

№ 39.

Geogr. längden är räknad från Stockholms Observatorium beläget 35° 43' 19" Ost från Ferro.

Fornlemningar:

- En Ättehög.
- Två eller flere Ättehögar.
- Stenkummel.
- Stensättning, fyrkantig eller rund.
- Två eller flere Bautastenar.
- Hällekista.

- Skikternas strykning och stupning (från Horisonten.)
- Lodrätt stående skikter.
- Skrynklade, liggande skikter.
- Räfflornas riktning.
- Jättegryta.
- Kallkälla.
- Mineral- och Helsokälla.

Fyndställe för Snäcklemningar:

- Nordsjö- och Ishafssnäckor (Saxicava, Mya, Astarte etc.)

Malmfyndigheter:

- Jernmalm.

- Afvägd punkt.
- Afvägd fixpunkt.



Postglaciala Bildningar: Nyare och Nutida
- Mosstorf.
- Torfdy.
- Svämmlera.
- Svämmsand.

Äldre
- Mosand.
- Åkerlera.

Glaciala Bildningar.
- Rullstensgrus.
- Krosstensgrus.

Dalformation.
- Lerskiffer.
- Qvartsitsandsten.
- Kappebogråvacka.
- Konglomerat.

- Eurit och Glimmerskiffer. (med Konglomerater.)
- Regenererad Hälleflinta.
- Hälleflinta.
- Täljsten.
- Jerbogneis.
- Dioritartad Jerbogneis.
- Jerngneis.
- Kroppefjällsgneis.
- Röd gneis.
- Diorit och Dioritskiffer.
- Diabas.
- Gabbro.
- Granit.

Grundadt på Kongl. Topografiska Corpsens Stomkarta i 1/50000 samt på sammandragna Landtmäterikartor. Wenerns djup i fot, utsatta i enlighet med det af Kongl. Sjökarte-Contoret år 1866 utgifna Sjökort.

Tryckt i Gen. Stab^s Lithogr. Inrättn. år 1870.

Skalan 1/50000 eller 5000 fot = 1 dec. tum.

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Sv. Mil

Under ledning och öfverinseende af Prof. Axel Erdmann är å detta blad såväl geologiska undersökningen som höjdmätningen utförd af V. Karlsson och A. H. Wahlqvist 1861_1863; revideringen af bergarterna af A. E. Törnebohm och D. Hummel 1867.