


Formbänningar:
En åttahög.
Två eller flera åttahögar.
Upphöjadt jordvätt.



- Torfyt
- Grått
- Svartlera
- Svartmor
- Flugvandsstenen
- Strandflytt (bänningar) och yngre
- Sand, delvis grus
- Jäbblers (Kronstullarna)
- Strömler (Båvällarna)
- Strömler (Båvällarna)
- Strömler (Båvällarna)

- Kalkhällar
- Borrhål (Alla i lagar yngre än den höllvande formationen)
- Fyndställe för smekstenningar
- Nordtjernsöcker
- Siltvattensmärken
- Avvägd punkt (Höjden över havet i fot)
- Hafets djup i fot
- Massans djup i fot
- Undervattensskog

- Observationspunkt för:
 - Lermargel
 - Kalkhaltig sand

Grundskizzen på K. Topografiska Corpsens måttningar i skalan 1:5000. Höjrens djup grundskizzen, samt Båvällarnas bänningar i öfverlagret med topografiska höjdränder i 1:50000 Landskrona. En del af de djupa rännan syns tydligt vid Landskrona stad samt några djupare äro tagna från en af J.C. Wilhe's af 1775 uppräpnad karta öfver hamnbanarne och sjöbottan omkring Landskrona.

Tyckts i Gen. Stab's Litogr. Anstalts Stockholm år 1879.
Skala 1:50000 eller 1 decimeter = 5000 fot, 1 centimeter = 500 meter.

