BLADET "LUND" L. O. 41.

Genge längden är räknad från Stockholms Observatorium, beläget 35° 45′, 18″ Ost från Ferro.

Fornlemningar:

- Attehög
- Stenkammar.
- Attehög med rest sten.
- Bautasten.
- Stensättning.

Observationspunkt för:

- L. Lerneregel.
- 00 fot under jordytan.



Grundadt på Topografiska Kårens mätningar i skalan 1:50 000

Tryckt i Centraltryckeriet, år 1886

Skala 1:50 000 eller 1 dec. tum = 5000 fot, 1 centimeter = 500 meter

1 Sv. mil.

10 Kilometer = 1 Nymil.

Geologiska undersökningen, å detta blad, är utförd 1869 af O. Gumaelius 1872–73 af M. Stolpe, och 1881 af S. A. Tullberg, reviderningen 1882 af S. A. Tullberg och 1883 af O. De Geer.

Postglaciala bildningar:
- Flygsand.
- Torfdy.
- Svämsand, Grund grus — Yngre och mellan
- Svämlera — Äldre
- Mosand.

Glaciala bildningar:
- Sim. — Övre morän.
- Jökellera (brosstenslera.)
- Heldsand (diluvialsand)
- Hrödlera (diluvialler.)
- Rullstensgrus — Undre morän.
- Jökelgrus (Brosstensgrus)
- Jökellera (Brosstenslera.)

Kenper:
- T — Sandsten, lera.

Öfversiluriisk:
- Sd — Sandsten.
- Sg — Mergelskiffer

Undersiluriisk:
- Sa — Lerskiffer
- Sk — Ortocerkalk.

Primordial: Alunsiffer

Kambrisk:
- E — Sandsten.

Jerngneis

Diabas

Skiktens styrkning och stupning.

Refflornas riktning.

Källa.

Mineralhållo.

Stenbrott.

100 Afrägd punkt (Höjden öfver hafvet i fot.)

5 Mossars djup i fot.

Fyndställe för Nordfjösnäckor.

" " Sitrullensnäckor.

" " arktiska växtlemningar.

" " vertebrater.

Borrhål, hvari stenkolsförande lager anträffats.

" " i lager, äldre än de kolförande.