BLADET SVARTKLUBBEN | VI. Ö. 30.

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING.
Ser. Aa. № 97.

Geogr. längden är räknad från Stockholms Observatorium, beläget 35°43′15″ Ost från Ferro.

Malmfyndigheter:
- Jernmalm
- Magnetkis

Fyndställe för snäcklemningar:
- Östersjösnäckor

Fornlemningar:
- Ättehögar
- Stenkummel
- Stensättning, oval (skeppssättning)




Postglaciala bildningar — Nyare och nutida:
- Mosstorf
- Torfdy
- Gytja
- Svämsand
- Svämlera

Äldre:
- Mosand

Glaciala bildningar:
- Hvarfvig lera och mergel
- Rullstensgrus
- Svallgrus
- Krosstensgrus

- Kalksten
- Hälleflinta
- Hälleflintgneis
- Hälleflintgneis med hornblende
- Grå gneis
- Hornblendegneis
- Ögongneis
- Röd gneis
- Röd granitgneis
- Dioritskiffer och diorit
- Diabas
- Pegmatit
- Granit
- Hornblendegranit

- Skiktens stryknng och stupning (från horisonten)
- Lodrätt stående skikt
- Refflornas riktning
- Kallkälla
- Mineralkälla

Grundadt på Topografiska Corpsens mätningar i 1/50000. Saltsjöns djup i fot utsatt i enlighet med K. Sjökarte-kontorets mätningar.

Tryckt i Centraltryckeriet år 1887.

Skala 1:50000 eller 1 dec. tum = 5000 fot, 1 centimeter = 500 meter.

1 mil

1 ny mil

Geologiska undersökningen å detta blad är utförd åren 1881 och 1883 af N. O. Holst, biträdd af J. Bergman och A. G. Högbom.