SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING


Sorsele
Vindelälven
Abmoträsket
Ajaure
Gardiken
Nämmesluokta
Nämmesluoktaberget
Nämmesluoktatjåkka
Nämmesluoktaträsket
Nämmesluoktavagge
Nämmesluoktavattsåive
Nämmesluoktavattsåive
Nämmesluoktavattsåive

Det stora inslaget av intermediära till basiska metavulkaniter i Bureområdet ger upphov till en markerad tyngdkraftsanomali. I sydvästra delarna av karttbladsområdet finns också ett markerat tyngdkraftsöverskott orsakat av de basiska vulkaniter i den Bottniska gruppen och den granodioritintrusion som ansätter vid mitten av metavulkaniterna. Sorselegraniterna, som förekommer i de nora delarna av karttbladsområdet, har i regel höga magnetiska susceptibiliteter än de likaldriga till obetydligt lägre Revsundsgraniterna. En markerad magnetisk totalfältsanomali kopplad till en markerad tyngdkraftsanomali återfinns i den alra nordligaste delen av karttbladsområdet och är likaledes orsakad av ett gabbromassiv. I dess omedelbara närhet förekommer syeniter med relativt höga magnetiseringsvinkler och karaktäristiska gammastrålningsegenskaper.

SVEKOFENNISKA YTBERGARTER

Metasedimentära bergarter

Bottniska gruppen

De äldsta bergarterna inom kartområdet är lagrad metavacka (omogen sandsten med varierande mängd finkornig eller lerig grundmassa) och metaargillit tillhörande den Bottniska gruppen. Denna term används här övergripande för svekofenniska ytbergarter i den s.k. Bottniska bassängen, det stora ytbergartsområde i centrala Sverige som består av omvandlade mäktiga lagerföljder av lerhaltiga sediment (Magnusson m.fl. 2000). Nordliga delar av detta område har i andra sammanhang kallats för Härnöformationen (Härnögruppen) (Lundqvist 1987).

De bottniska ytbergarterna påträffas företrädesvis norr och söder om sjön Storjuktan inom sydvästbladets område. Mindre förekomster med bottniska metasedimentära bergarter finns också vid Långtjärn (4–5 b), som undergår till bergarterna i Dobbingruppen nordnordost om Skraveberget (5–6 c–e), och söder om Sorsele mellan Norra Tjällmotjärnet (3–4 a–b) i Revsundsområdet (4–5 a). Bureområdet förkommer också metavackvacka med inlagringar av metaargillit och metabasalt. Den senare, som är blottad längs Långtjärn (4), har en kemisk sammansättning som motsvarar basalt och andesitbasalt i den Bottniska gruppen inom kartområden 23H Stensele och 24H Sorsele SV. Alla dessa förekomster representerar de nordvästligaste utlöparna av den Bottniska gruppen.

Metagråvackan uppvisar ursprungliga sedimentstrukturer såsom slumstrommar (turbiditströmmar) på havsbottnen eller i deltan i havet utanför kontinentsockeln. Vid avsättningen av en sådan slumström i suspension bildas en turbiditenhet. Det grövre, sandiga materialet sedimenterade snabbast och avsattes underst i enheten. Det finkorniga argillitiska (leriga) materialet sedimenterade långsammare och avsattes ovanpå det grövre sandiga i den övre delen av turbiditenheten. Metagråvackan är vanligen parallellagrad i grad till 30 cm tjocka turbiditenheter. Tidvis avtog avsättningen ur slumströmmar. Under den tiden dominerade en stängt pågående sedimentation av finkornigt lerigt material, vilket gav upphov till bildning av mäktiga lerskiffrar av argillitiskt material som idag föreligger som metaargillit (svartskiffer). Dessa ställvis grafitförande och vanligen magnetkisförande metaargilliter framträder p.g.a. sina relativt höga magnetiseringar och elektriska ledningsförmågor i allmänhet tydligt i de magnetiska och elektromagnetiska mätningarna. De metasedimentära bergarterna har generellt relativt låg magnetisk susceptibilitet (oftast under 100x10⁻⁵ SI-enheter) även om de ibland når höjre värden. Remanent magnetisering orsakad av magnetkis är dock vanlig, ja tallan med Q-värden mellan 10 och 20 förekommer. Vissa lerskiffrar har dessutom låga totalmagnetiseringen trots den relativt låga magnetiska susceptibiliteten.

De grå, sandiga lagren i metagråvackan innehåller upp till 2–3 mm stora, kantiga klaster av främst kvarts, plagioklas och bergartsfragment. Mellan dessa är finkornig och består främst av kvarts, plagioklas, biotit, muskovit, klorit och opakmineral. Typiska accessoriska mineral är zirkon, turmalin och sekundär kalcit. De mörkgrå till svarta, finkorniga delarna i turbiditenheterna består i metaargillit och i metagråvacka som har halt av biotit och på vissa platser muskovit och klorit samt i jämförelse med de sandigare lagren mindre mängd kvarts och plagioklas (t.ex. Lundström 1998, Einarsson 1979).

Enstaka sedimentära strukturer såsom lagergränser och skiktning (korsstorleksgradering) kan på en del lokaler användas för att bedöma de avsatta sedimentens ursprungliga lagringsstratigrafi. Synsedimentära rutschningar och skred i icke förfastade enskilda lerskiktpaket, eller mäktigare hela sekvenser, har brutit vinder de ursprungliga lagren och bildat kaotiska lagerföljder med brecciebildningar. Dessa har speciellt i de metasedimentära bergarterna söder om Storjuktan. I samband med regionalmetamorfosen blev ytbergarterna starkt deformerade och veckade i minst två dominerande veckfaser. Särskilt metaargilliterna är skiffriga och uppvisar en tydlig skiffrighet samt mineralorientering i veckaxelplanet och veckaxlarnas riktning. Vid veckning av metagråvackan har halt av finkornig och/eller lerig grundmassa gynnat bildningen av mer eller mindre omvandlad fin- till grovkornig skiffrighet. Den förkrossning och finkornig rostfrittande hållfasthet som är typisk för svekofenniska ytbergarter i allmänhet har också påverkat dessa bergarter.

Den svekokarelska metamorfosen har generellt resulterat i en kornstorleksförgroving och, främst i de argillitiska lederna av ytbergartsföljderna, bildning av metamorfa mineral som biotit, muskovit, granat och andalusit. Dessa är nu i de flesta fall starkt retrogradomvandlade till mycket finkornig muskovit och fältspat. I gråvackan uppträder kvarts som mer eller mindre oregelbunda segregationer eller som tunna, vinkelräta ådror och ryl på skiktytorna. Dessa kvartsutsöndringar är kvartsgångar som vanligen är metamorfosgrad, för att i amfibolitfaciesområden följas av granitiska ådror och migmatitisering.

Vargforsgruppen

I Bureområdet överlagras de Bottniska ytbergartarna utan synbar diskordans av en ställvis vulkanogen metagråvacka. Med vulkanogen avses klastisk sedimentär bergart med varierande inblandning av fragment (klaster) bestående av vulkaniska utbrottsprodukter. Tunna, konforma inlagringar av polymikt metakonglomerat förekommer också i metagråvackan. Metakonglomeraten innehåller bl.a. enstaka bollar av grå, medelkornig granitoid men främst rödbrun ryolit och plagioklasporfyrisk andesit vilka härrör från Arvidsjaurgruppens terrestriska vulkaniter.

Närvaro av bollar av vulkaniter från Arvidsjaurgruppen visar att denna metagråvacka i Bureområdet kronostratigrafiskt kan korreleras med Vargforskonglomeraten (särskilt det övre s.k. Dödmanbergskonglomeratet som innehåller bollar av Arvidsjaurvulkaniter) och "Elvabergsseries" gråvackor och skiffrar enligt Kautskys (1957) stratigrafiska schema. Dessa bergartsområden överlagrar Skellefteområdets ca 1880 till 1890 miljoner år gamla vulkaniter. Högbom (1937) och Gavellin & Kulling (1955) sammanförde i princip alla metagråvackor i Västerbotten till den s.k. fyllitserien. Sandstenar, gråvackor och fyllitiska skiffrar i direkt anslutning till Vargforsformationens grovklastiska bergarter härförde de dock till den s.k. Vargforsformationen.

Allen m.fl. (1997) sammanfattar "Elvabergsseriens" sedimentära bergarter och Vargforskonglomeraten under begreppet Vargforsgruppen. I samband med undersökningar i karttbladsområdena 24I Storavan NV och SV inrnärkades motsvarande ytbergarter också i Vargforsgruppen (Bergström & Triumf 2002 a & b). I detta arbete följs denna stratigrafiska nomenklatur. Denna uppdelning och klassificering är helt naturligt något osäker och man skulle också kunna tänka sig att de metasedimentära bergarter, som underlagrar Bureområdets Arvidsjaurvulkaniter tillhör de övre om distala delarna av Bottniska gruppen. Faciesövergången mellan marina ytbergarter och terrestriska vulkaniter kan följaktligen också representera gränsen mellan Bottniska gruppen och Arvidsjaurgruppen. Perdahl & Einarsson (1994) benämner alla metasedimentära bergarter i Bureområdet (de som underlagrar metavulkaniterna men även de i den undre delen av vulkanitsekvensen) för Skalsfomationen. Dessa bergarter placerar de stratigrafiskt i övre delen av fyllitserien respektive övre delen av Arvidsjaurgruppen enligt Kautskys (1957) stratigrafi.

Graderad skiktning och i enstaka fall skredstrukturer (Fig. 1) visar att de avsatta sedimenten idag ligger upprättkringar till nordväst. De mindre bollarna av vulkaniterna i Arvidsjaurgruppen (Bureområdet) överlagrar Vargforsgruppens ytbergarter. Mot gränsen till vulkaniterna har de metasedimentära bergarterna på många platser olika grad av inblandning av mafiskt vulkanoklastiskt material (luff och tuffit). Denna gränszon representerar alltså en gradvis övergång mellan epiklastiska och vulkanoklastiska bergarter.



Fig. 1. Skredstruktur lagrad i metagråvacka i Vargforsgruppen, 4 km sydväst om Bure (4 i). 7272580/1590365

Slumped beds in bedded metagreywacke in the Vargfors Group.

De petrofysiska egenskaperna hos Vargforsgruppens metasedimentära bergarter skiljer sig något från Bottniska gruppens; dels saknas högre magnetiska susceptibiliteter hos Vargforsgruppen (de ligger i regel under 50x10⁻⁵ SI-enheter), dels har inga höga Q-värden uppmätts. Toriumhalten hos Vargforsgruppen är generellt lägre än hos Bottniska gruppens bergarter inom kartområdet, vilket kan indikera transport av material från olika ursprungsområden (provenanser).

Arvidsjaurgruppen (Bureområdets ytbergarter)

Överst i lagerföljden i Arvidsjaurgruppens bergarter i Bureområdet (för beskrivning av de vulkaniska bergarterna i Arvidsjaurgruppen se kapitel "metavulkaniska bergarter") påträffas ett ställvis grovklastiskt, polymikt metakonglomerat (benämnt Loiteformationen av Perdahl & Einarsson (1994). Konglomeratet ändrar karaktär mellan olika lokaler i ytbergartsstråket. Sydväst om Ljutorråsket (5 h) finns en röd, vulkanogen sandsten och ett rödaktigt konglomerat där bollarna främst utgörs av rödbrun, fältspatporfyrisk metaryolit till metadacit. Sydväst om Hällbäckberget (5 h) finns ett mycket kraftigt försköftat, matrixstött vulkanogent konglomerat med relativt få bollar av ryolit, vulkanisk sandsten, grå granitoider och kvarts. Bollarna är svagt till kraftigt utdragna, upp till 40 cm långa med längd–breddförhållande upp till 20. Matrix är grågrön och finkornig, fyllonitisk med uppskattningsvis andesitisk till basaltisk sammansättning. Längre åt söder på Lillberget (3 h) finns ett klaststött (bollar i kontakt med varandra) polymikt konglomerat med bollar av bl.a. grå tonalit, lagrad gråvacka, grovt plagioklasporfyrisk andesit och kvarts (Fig. 2). Även blottningar på Matbergsleden (8 j) visar ett vanligen grovklastiskt konglomerat med mycket varierande sammansättning i bollmaterialet, vilket domineras av mafiska vulkaniter tillsammans med granitoider och underordnat felsiska vulkaniter. Konglomeratet är i regel matrixstött men lokalt ligger bollarna i kontakt med varandra. Alla dessa avsättningar kan troligen korreleras med den s.k. Ledfatsgruppen (Offerberg 1959) sandstenar och konglomerat i karttbladet 24I Storavan SV (Bergström & Triumf 2002b).

Det polymikta konglomeratet uppvisar stor variation i magnetisk susceptibilitet. Kalium-, uran- och toriumhalten från gammaspektrometri på hällar visar att konglomeratet innehåller något mindre av dessa grundämnen i förhållande till de andra metasedimentära bergarterna.



Fig. 2. Polymikt metakonglomerat i Arvidsjaurgruppen. Lillberget (3 h). 7267250/1585340

Polymict metaconglomerate in the Arvidsjaur Group.

Metavulkaniska bergarter

Bottniska gruppen

I de metasedimentära bergarterna tillhörande den Bottniska gruppen finns en större förekomst av mafisk metavulkanit. På Jättarberget (0 d) vid Storjuktans södra strand förekommer metabasalt i form av kuddlava och vulkaniska breccia och sandsten. I kartområdets östra del finns ett ca 2,5 km långt stråk (4–5 i–j) med metabasalt som bedöms tillhöra den Bottniska gruppen (se ovan). Metabasalten är ställvis riktigt strömkornförande och på vissa platser påträffas ljusgröna flammor och ådror med omvandlad vulkanit. Metabasalten har ungefär samma kemiska sammansättning som den metabasalt som påträffas i den Bottniska gruppen inom kartområdet 23H Stensele.

Felsiska metavulkaniter förekommer i området nordväst om Ersmarksberget (0 c). De utgörs till största delen av metadacit och porfyroidal finkornig metaryolit (1 c). Metadaciten är grå till grönaktig och plagioklasporfyrisk med 0,5 till 2 mm stora strökorn. Den är dock vanligen relativt kraftigt sericitomvandlad vilket medför att de primära vulkaniska texturerna är svåra att observera. I hällblottningar är daciten relativt homogen och kohärent. Inflytande från vulkaniter av rhyolitkaraktär saknas till mer distala delar av den Bottniska gruppen. Detta skulle kunna förklara den förhållandevis låga magnetiska susceptibiliteten inom Arvidsjaurgruppens mafiska metavulkaniter varierar från omkring 50x10⁻⁵ till 7000x10⁻⁵ SI-enheter och Q-värden är låga (<0,5). Densiteten varierar mellan cirka 2850 och 2950 kg/m³.

Polymikt, vulkaniskt metakonglomerat förekommer i den basaltiska–andesitiska metasandstenen, dels som mindre förekomster i distala vissa vulkanfacies. Metakonglomeratet består av klaster i upptäckta på ytor från grusigt, matrixstött med relativt små (1 till 10 cm) bollar, till mycket grovt, klaststött med bollar upp till 1 m i storlek. Bollarna är vanligen väl rundade och utgörs företrädesvis av felsiska och, underordnat, mafiska vulkaniter av Arvidsjaurgruppen (fig. 3). Matrix består av sandigt till grusigt, finkornigt, mafiskt, vulkaniskt material. De olika varianterna av metakonglomeratet växellagrar vanligen med varandra. Det grusiga metakonglomeratet övergår på många platser i sin tur till vulkanisk metasandsten.



Fig. 3. Polymikt, vulkaniskt metakonglomerat med inlagrad vulkanisk metasandsten i undre delen av Arvidsjaurgruppen. Bollar består av felsiska och mafiska vulkaniter av Arvidsjaurgruppen. Matrix består av sandigt till grusigt, tämligen mafiskt material. Hällbäcken 4 km söder om Bure (4 i). 7273620/1590260

Polymict, volcanogenic metaconglomerate with an intercalation of volcanogenic metasandstone in the lower part of the Arvidsjaur Group. The clasts are felsic and mafic volcanic rocks from the Arvidsjaur Group. Matrix is composedof mafic material of sand and gravel size.

Stratigrafiskt över enheten med basaltisk till andesitisk metasandsten och det polymikta, vulkaniska metakonglomeratet ligger en relativt mäktig enhet med grå till ljust rödbrun, ofta ignimbritstrimmig och fältspatporfyrisk metaryolit till metadacit. Autoklastiskt brecciområde ligger på inlagringar förekommer på flera nivåer. De felsiska vulkaniterna avsattes i huvudsak på land som pyroklastiska flöden. Idag är de vanligen sericitomvandlade fast med relativt välbevarad relikt textur. Intrafomationella vulkanoklastiska, felsiska sandstenar, grusiga konglomerat och grova bollrika konglomerat förekommer som inlagringar t.ex. på Fäbodberget (4 h). Då bollmaterialet och matrix uteslutande är felsiska (enstaka andesiter förekommer dock som bollar) är den klastiska texturen föga framträdande. I anslutning till deformationszoner är de felsiska metavulkaniterna plastiskt förformade, och denna folidom övergångar ofta av senare sprödtektonik varvid bergarterna blir kraftigt uppsprickna. Den magnetiska susceptibiliteten är i regel hög, 1000 till 2000x10⁻⁵ SI-enheter, även om undantag förekommer. Den remanenta magnetiseringen är oftast låg med Q-värden under 0,4. Densiteten ligger typiskt i intervallet 2630 till 2700 kg/m³. Gammastrålningsspektrometri visar på förhållandevis höga kalium-, uran- och toriumhalter.

Metaryoliten till metadaciten övergras av en enhet med metadesitoid som utgörs av olika typer av lavor, vulkaniska sandstenar (tuffer) och autoklastiska breccior. I den centrala delen av metaandesitsträket dominerar glest plagioklasporfyrisk metaandesit med vanligen 1 till 3 mm långa, euhedrala till subhedrala strökorn. Mellanmassan är mörkt grå, mycket finkornig (främst regellöst orienterade plagioklaslister i mycket finkornig biotit, klorit, opak, leukoxen, sericit, kalcit och epidot) och ställvis mycket amygdalrik. Amygdalerna är främst fyllda med kvarts samt underordnat kalcit och biotit. Ställvis är de centrala delarna i vissa amygdaler fortfarande ofyllda. I de yttre delarna av stråket dominerar tätporfyrisk (30 till 50 volymprocent strökorn) metaandesit. Plagioklas dominerar bland strökornen (1 till 5 mm stora och förhållandevis euhedrala), men mafiska strökorn förekommer också (1 till 3 mm stora och euhedrala till subhedrala). Mellanmassan är grå, finkornig till mycket finkornig med sporadiska orgelgastamosande ådror. Metavulkaniten är förkrossad till mycket finkornig. Den magnetiska susceptibiliteten visar en bimodal fördelning med ett maximum omkring 100–400x10⁻⁵ SI-enheter och ett annat omkring 7000–10000x10⁻⁵ SI-enheter. Den remanenta magnetiseringen är ringel låg men enstaka höga värden påträffas också. Densiteten varierar inom ett stort intervall från cirka 2700 till 2900 kg/m³, vilket talkas som stor inhomogenitet i sammansättningen.

Mot grönsgrå metaandesiter i ett antal meter horisonter i den södra delen av gabbrokroppen. Metabasanten består av finkornig till mycket finkornig mellanmassa och varvligen 20 till 30 volymprocent strökorn som i huvudsak är mafiska, 1 till 5 mm stora och oregelbundet formade. Listformade plagioklasströkorn förekommer underordnat i mängd. Även i lagerföljden uppträder det polymikta metakonglomerat, som beskrivits ovan i avsnittet "Metasedimentära bergarter".

Fig. 4 Ryolitisk ignimbrit med upp till 15 cm stora litofyser i Björnkönsformationen i den undre delen av Dobblongruppen, 1 km söder om Gippervare (5 c). 7278110/1563140

Rhyolitic, ignimbrite with up to 15 cm large lithophysae in the Björnkönsen Formation in the lower part of the Dobbion Group.

Ryoliterna i Gippervareformationen utgörs av relativt enhetliga, grå kvartsporfyrer till rödbruna kvarts-fältspatporfyrer. De senare har vanligen något större strökorn och påträffas företrädesvis i de övre (nordliga) delarna av formationen (Einarsson 1979). Vulkaniska breccior förekommer vanligen allmänt i de centrala delarna av Gippervareformationen. Vulkaniterna på vissa platser en tämligen tydlig ignimbritstrimmighet. I de västra delarna tolkas dock formationen främst bestå av olika typer av ryolitiska tuffer (Einarsson 1979).

Bergartsgeokemiska data vista viss variation. Metaryoliterna har skiftande halter vad avser huvud- och spårelementhalter med djupbergarterna i Sorsele- och Revsundsvulkanerna (Bark & Claesson 2001). Dessutom finns det finkorniga porfyriska varianter av Sorselegranit som petrografiskt liknar vulkaniterna. Dobblongruppens vulkaniter bedöms alltså vara extrusiva motsvarigheter till den något senare intruderade Sorselegraniten.

På den magnetiska anomalikartan finns ett stråk med ostnordostligt strykande högmagnetiska anomalier i nyvlinnia Gippervareformationen. Dessa finns en relativt bit ifrån förekomst av magnetisk susceptibilitet som kan förklara de sydliga delarna av anomalikomplexet. Det anmärkningsvärda är dock att den del av massivet med Sorselegranit som påträffas omedelbart norr om ryoliterna också visar samma anomalistruktur. Detta skulle kunna förklaras av förekomst av magnetkis i Sorselegraniten (5 c), det andra har tagits ca 2 km nordost om sjön Stor Dobblon (5 b). Graniten vid bägge dessa lokaler består av massformig, just grå, små- till grovporfyrisk monzogranit och utgör alltså delar av underlaget till Dobblongruppen. Petrografiskt och geokemiskt liknar denna de övriga monzogranitera i Revsundsvisten (Bark & Claesson 2001). Däremot skiljer den sig markant från de granodioritiska till tonalitiska, i varierande grad folierade, tidigsvekokarelska djupbergarterna i regionen. Det är ej möjligt att inom detta projekts ram utröna huruvida dessa granitprover representerar en äldre Revsundsliknade granit eller om de analyserade zirkonkristallerna utgörs av äldre, ouppsmälta (restit)kristaller i en (verklig) Revsundsgranit.

Sorselesviten

Berggrunden inom kartbladsområdet 24H Sorsele NV domineras av postkretoniska, massformiga djupbergarter tillhörande den s.k. Sorselesviten. Denna består främst av grå till röd, medelkornig, biotit-hornbländeförande monzogranit. Kvartshalten är ofta låg och kvartsmonzonit och kvartssyenit förekommer i stora områden.

Petrofysiskt karaktäriseras majoriteten av granitoiderna och syenitoiderna inom Sorselesviten av relativt höga magnetiska susceptibiliteter, i regel 500–5000x10⁻⁵ SI-enheter. Där har den grå till rödgrå graniten till kvartsmonzoniten generellt höga magnetiska susceptibiliteter, medan den röda till rödgrå graniten ibland kan ha susceptibiliteter lägre än 200x10⁻⁵ SI-enheter. Inom Sorselesviten kan kvartsmonzoniten till kvartssyeniten särskiljas petrofysiskt genom generellt högre densitet (ca 2680–2720 kg/m³) samt lägre torium- och uraninnehåll jämfört med de övriga granitoiderna. Graniten till kvartsmonzoniten (Bråtenberg facies) karaktäriseras av högt toriuminnehåll.

Bergarterna inom Sorselesviten är något yngre än granitoiderna i Revsundsvisten och Dobblongruppen. Ytbergarter och han heltiga, intrusiva avskärningsförhållanden mot kontaktrelationer mot dessa (t.ex. Högbom 1937, Einarsson 1979). På t.ex. södra delen av Skravelberget blottas en avklyvningskontakt i Sorselesviten mot Revsundsgraniten. Där minskar kornstorleken successivt mot kontakten och en fint medelkornig till finkornig mikrokliningranit övergår i en grov, porfyrisk granit med kontakten. Större områden med sådan granitporfyri (7 kandfacies förekommer också norr och nordost om Giltjaure (4 b) (t.ex. Gavellin & Kulling 1955). En U-Pb-datering av zirkoner från en Sorselesvariant från Stor Gråtu (9 i) gav åldern 1791±22 miljoner år (Skiöld 1988).

Karaktäristiskt för bergarterna i Sorselesviten är en granulär, anhedral textur, dvs. de är relativt jämnkorniga med påtagligt sammanvuxna mineral med oregelbundna kristallytor. Plagioklaskornen är vanligen kraftigt sericit- och i varierande grad epidot-positivomvandlade (saussuritiserade) i de centrala delarna. Detta ger speciellt i den rödа till gråröda varianten (Bråntberg facies) en typisk grönfärgning av plagioklasen. Texturellt utmärks bergarterna i Sorselesviten också av att kvarts och fältspat visar tydliga tecken på samväxtvaringar såsom myrmekit (kvarsiv utväxt på plagioklas) och antiperthit (mikroklin i plagioklas). De mafiska mineralen, främst amfibol och biotit samt underordnat titanit, hematit, magnetit och ilmenit, förekommer ofta i små aggregat. Den förhållandevis finkorniga texturen samt enhetligt sprid kvarts gör att man i handstuff lätt kan underskatta mängden kvarts i Sorselesvivens bergarter.

Förträdesvis förekommer två huvudriktningar för deformationszoner i graniten: ett system med nordvästlig till nordlig riktning, till största delen subvertikala, till mindre utsträckning med ostnordostlig riktning (deformationszoner (se nedan). Det bör noteras att graden av penetrativ, ibörje förskiffring generellt är mycket hög i metagraniten, och stråken med denna bergart är vanligen reaktiverade av senare plastiska och spröda skjuvzoner.

Fig. 5. Polymikt metakonglomerat med inlagrad vulkanisk metasandsten i undre delen av Arvidsjaurgruppen. Bollarna består av felsiska och mafiska vulkaniter av Arvidsjaurgruppen. Matrix består av sandigt till grusigt, tämligen mafiskt material. Hällbäcken 4 km söder om Bure (4 i). 7273620/1590260

Polymict, volcanogenic metaconglomerate with an intercalation of volcanogenic metasandstone in the lower part of the Arvidsjaur Group. The clasts are felsic and mafic volcanic rocks from the Arvidsjaur Group. Matrix is composedof mafic material of sand and gravel size.

Stratigrafiskt över enheten med basaltisk till andesitisk metasandsten och det polymikta, vulkaniska metakonglomeratet ligger en relativt mäktig enhet med grå till ljust rödbrun, ofta ignimbritstrimmig och fältspatporfyrisk metaryolit till metadacit. Autoklastiskt brecciområde ligger på inlagringar förekommer på flera nivåer. De felsiska vulkaniterna avsattes i huvudsak på land som pyroklastiska flöden. Idag är de vanligen sericitomvandlade fast med relativt välbevarad relikt textur. Intrafomationella vulkanoklastiska, felsiska sandstenar, grusiga konglomerat och grova bollrika konglomerat förekommer som inlagringar t.ex. på Fäbodberget (4 h). Då bollmaterialet och matrix uteslutande är felsiska (enstaka andesiter förekommer dock som bollar) är den klastiska texturen föga framträdande. I anslutning till deformationszoner är de felsiska metavulkaniterna plastiskt förformade, och denna folidom övergångar ofta av senare sprödtektonik varvid bergarterna blir kraftigt uppsprickna. Den magnetiska susceptibiliteten är i regel hög, 1000 till 2000x10⁻⁵ SI-enheter, även om undantag förekommer. Den remanenta magnetiseringen är oftast låg med Q-värden under 0,4. Densiteten ligger typiskt i intervallet 2630 till 2700 kg/m³. Gammastrålningsspektrometri visar på förhållandevis höga kalium-, uran- och toriumhalter.

Metaryoliten till metadacieten övergras av en enhet med metaandesit som utgörs av olika typer av lavor, vulkaniska sandstenar (tuffer) och autoklastiska breccior. I den centrala delen av metaandesitsträket dominerar glest plagioklasporfyrisk metaandesit med vanligen 1 till 3 mm långa, euhedrala till subhedrala strökorn. Mellanmassan är mörkt grå, mycket finkornig (främst regellöst orienterade plagioklaslister i mycket finkornig biotit, klorit, opak, leukoxen, sericit, kalcit och epidot) och ställvis mycket amygdalrik. Amygdalerna är främst fyllda med kvarts samt underordnat kalcit och biotit. Ställvis är de centrala delarna i vissa amygdaler fortfarande ofyllda. I de yttre delarna av stråket dominerar tätporfyrisk (30 till 50 volymprocent strökorn) metaandesit. Plagioklas dominerar bland strökornen (1 till 5 mm stora och förhållandevis euhedrala), men mafiska strökorn förekommer också (1 till 3 mm stora och euhedrala till subhedrala). Mellanmassan är grå, finkornig till mycket finkornig med sporadiska orgelgastamosande ådror. Metavulkaniten är förkrossad till mycket finkornig. Den magnetiska susceptibiliteten visar en bimodal fördelning med ett maximum omkring 100–400x10⁻⁵ SI-enheter och ett annat omkring 7000–10000x10⁻⁵ SI-enheter. Den remanenta magnetiseringen är ringel låg men enstaka höga värden påträffas också. Densiteten varierar inom ett stort intervall från cirka 2700 till 2900 kg/m³, vilket talkas som stor inhomogenitet i sammansättningen.

Mot grönsgrå metaandesiter i ett antal meter horisonter i den södra delen av gabbrokroppen. Metabasanten består av finkornig till mycket finkornig mellanmassa och varvligen 20 till 30 volymprocent strökorn som i huvudsak är mafiska, 1 till 5 mm stora och oregelbundet formade. Listformade plagioklasströkorn förekommer underordnat i mängd. Även i lagerföljden uppträder det polymikta metakonglomerat, som beskrivits ovan i avsnittet "Metasedimentära bergarter".

SEN- TILL POSTSVEKOKARELSKA YTBERGARTER

De sen- till postsvekokarelska ytbergarterna i den s.k. Dobblongruppen sträcker sig i ett 3 till 5 km brett och 30 km långt område från fjällfronden i väster åt nordnordost, via Nalovardo (7 f) till Datjebakte (7 g) i öster. Gruppens bergarter överlagrar med en diskordans den äldre svekokarelska gruppen och de yngre (nordliga) delarna av formationen (Einarsson 1979). Vulkaniska breccior förekommer vanligen allmänt i de centrala delarna av Gippervareformationen. Vulkaniterna på vissa platser en tämligen tydlig ignimbritstrimmighet. I de västra delarna tolkas dock formationen främst bestå av olika typer av ryolitiska tuffer (Einarsson 1979).

Bergartsgeokemiska data vista viss variation. Metaryoliterna har skiftande halter vad avser huvud- och spårelementhalter med djupbergarterna i Sorsele- och Revsundsvulkanerna (Bark & Claesson 2001). Dessutom finns det finkorniga porfyriska varianter av Sorselegranit som petrografiskt liknar vulkaniterna. Dobblongruppens vulkaniter bedöms alltså vara extrusiva motsvarigheter till den något senare intruderade Sorselegraniten.

På den magnetiska anomalikartan finns ett stråk med ostnordostligt strykande högmagnetiska anomalier i nyvlinnia Gippervareformationen. Dessa finns en relativt bit ifrån förekomst av magnetisk susceptibilitet som kan förklara de sydliga delarna av anomalikomplexet. Det anmärkningsvärda är dock att den del av massivet med Sorselegranit som påträffas omedelbart norr om ryoliterna också visar samma anomalistruktur. Detta skulle kunna förklaras av förekomst av magnetkis i Sorselegraniten (5 c), det andra har tagits ca 2 km nordost om sjön Stor Dobblon (5 b). Graniten vid bägge dessa lokaler består av massformig, just grå, små- till grovporfyrisk monzogranit och utgör alltså delar av underlaget till Dobblongruppen. Petrografiskt och geokemiskt liknar denna de övriga monzograniterna i Revsundsvisten (Bark & Claesson 2001). Däremot skiljer den sig markant från de granodioritiska till tonalitiska, i varierande grad folierade, tidigsvekokarelska djupbergarterna i regionen. Det är ej möjligt att inom detta projekts ram utröna huruvida dessa granitprover representerar en äldre Revsundsliknade granit eller om de analyserade zirkonkristallerna utgörs av äldre, ouppsmälta (restit)kristaller i en (verklig) Revsundsgranit.

Sorselesviten

Berggrunden inom kartbladsområdet 24H Sorsele NV domineras av postkretoniska, massformiga djupbergarter tillhörande den s.k. Sorselesviten. Denna består främst av grå till röd, medelkornig, biotit-hornbländeförande monzogranit. Kvartshalten är ofta låg och kvartsmonzonit och kvartssyenit förekommer i stora områden.

Petrofysiskt karaktäriseras majoriteten av granitoiderna och syenitoiderna inom Sorselesviten av relativt höga magnetiska susceptibiliteter, i regel 500–5000x10⁻⁵ SI-enheter. Där har den grå till rödgrå graniten till kvartsmonzoniten generellt höga magnetiska susceptibiliteter, medan den röda till rödgrå graniten ibland kan ha susceptibiliteter lägre än 200x10⁻⁵ SI-enheter. Inom Sorselesviten kan kvartsmonzoniten till kvartssyeniten särskiljas petrofysiskt genom generellt högre densitet (ca 2680–2720 kg/m³) samt lägre torium- och uraninnehåll jämfört med de övriga granitoiderna. Graniten till kvartsmonzoniten (Bråtenberg facies) karaktäriseras av högt toriuminnehåll.

Bergarterna inom Sorselesviten är något yngre än granitoiderna i Revsundsvisten och Dobblongruppen. Ytbergarter och han heltiga, intrusiva avskärningsförhållanden mot kontaktrelationer mot dessa (t.ex. Högbom 1937, Einarsson 1979). På t.ex. södra delen av Skravelberget blottas en avklyvningskontakt i Sorselesviten mot Revsundsgraniten. Där minskar kornstorleken successivt mot kontakten och en fint medelkornig till finkornig mikrokliningranit övergår i en grov, porfyrisk granit med kontakten. Större områden med sådan granitporfyri (7 kandfacies förekommer också norr och nordost om Giltjaure (4 b) (t.ex. Gavellin & Kulling 1955). En U-Pb-datering av zirkoner från en Sorselesvariant från Stor Gråtu (9 i) gav åldern 1791±22 miljoner år (Skiöld 1988).

Karaktäristiskt för bergarterna i Sorselesviten är en granulär, anhedral textur, dvs. de är relativt jämnkorniga med påtagligt sammanvuxna mineral med oregelbundna kristallytor. Plagioklaskornen är vanligen kraftigt sericit- och i varierande grad epidot-positivomvandlade (saussuritiserade) i de centrala delarna. Detta ger speciellt i den rödа till gråröda varianten (Bråntberg facies) en typisk grönfärgning av plagioklasen. Texturellt utmärks bergarterna i Sorselesviten också av att kvarts och fältspat visar tydliga tecken på samväxtvaringar såsom myrmekit (kvarsiv utväxt på plagioklas) och antiperthit (mikroklin i plagioklas). De mafiska mineralen, främst amfibol och biotit samt underordnat titanit, hematit, magnetit och ilmenit, förekommer ofta i små aggregat. Den förhållandevis finkorniga texturen samt enhetligt sprid kvarts gör att man i handstuff lätt kan underskatta mängden kvarts i Sorselesvivens bergarter.

Förträdesvis förekommer två huvudriktningar för deformationszoner i graniten: ett system med nordvästlig till nordlig riktning, till största delen subvertikala, till mindre utsträckning med ostnordostlig riktning (deformationszoner (se nedan). Det bör noteras att graden av penetrativ, ibörje förskiffring generellt är mycket hög i metagraniten, och stråken med denna bergart är vanligen reaktiverade av senare plastiska och spröda skjuvzoner.

Revsundsgranitoiderna intruderade väsentligen i slutskedet av den svekokarelska orogenesen, efter att landskapsreliefen utjämnats och den kontinentala skorpan förtjockats. Den är därför i allmänhet undersökt och skrivzoner. Den magnetiska susceptibiliteten är vanligen höge i stråk med rödfärgad granit. Ett exempel är några lokaler på nordostsluttningen av Rågoliden (1 e) där rödfärgad granit påträffats med en magnetisk susceptibilitet av 100–8000x10⁻⁵ SI-enheter. Dessa stråk är vanligen associerade med Granmyrskjuvzonen i Lasivall (Allberg 1985). Lasivallgruppen överlagras av alunskifferformationen som består av svarta ler- och alunskiffrar. Dessa består främst av lerrmineral med varierande halter av kvarts eller karbonater, sulfider (främst pyrit) och organiskt material. Stratigrafiskt är alunskifferformationen i Sverige av mellankambrisk till, lokalt, tidigordovicisk ålder (Andersson m.fl. 1985).

ANOROGENA BERGARTER

Diabas

Den yngsta prekambriska bergarten är anorogen diabas. Den uppträder företrädesvis i dels ett nordöstligt, dels ett nordvästligt strykande gångsystem som klipper alla andra bergarter i urberget. Enligt Lindroos & Smellie (1979) är de 50–150 meter breda. Gångarna är övervägande vertikala och kontrollerade av sprickzoner. Den magnetiska susceptibiliteten är vanligen höge i stråk med rödfärgad granit. Ett exempel är några lokaler på nordostsluttningen av Rågoliden (1 e) där rödfärgad granit påträffats med en magnetisk susceptibilitet av 100–8000x10⁻⁵ SI-enheter. Dessa stråk är vanligen associerade med Granmyrskjuvzonen i Lasivall (Allberg 1985). Lasivallgruppen överlagras av alunskifferformationen som består av svarta ler- och alunskiffrar. Dessa består främst av lerrmineral med varierande halter av kvarts eller karbonater, sulfider (främst pyrit) och organiskt material. Stratigrafiskt är alunskifferformationen i Sverige av mellankambrisk till, lokalt, tidigordovicisk ålder (Andersson m.fl. 1985).

FJÄLLBERGGRUND

Den kaledoniska fjällberggrundens östra rand (fjällfronden) påträffas längs västra kanten av kartbladsområdet. Fjällberggrunden uppbyggs i huvudsak av tektoniskt förflyttade (alloktona) bergarter som vilar på en tunn zon med autoktona sedimentära bergarter. I Skandinavien utgörs överlagda delen av fjällberggrunden av allokton-bergart