

abs! i st. för
67

Karta
öfver
Håkansbo Jernberg

Beläget på Håkansbo egor i Öster-Lenusa Socken
af Upsala Län, upprättad
efter egna mätningar som afslutades 14 Juni 1913
af
Oscar Abrahamson

Derill behörig genom Kungl. Com. Coll. resolution af den 27 Mars år 1885.

-  Svart malm
 "Lagerarter" Amphibolit (Basalt tuff)
 Lepstit

— — — — — egogränser
— — — — — gräns för inmutat
område


Skala 1:800


10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Meter


657 4/26

Komplekteringsmätning till denna karta

[illegible]







Profiler

after c-d

after a-b

0 Meter

20

40

60

0


20

40

60

a

d





Märkpunktsblad

HÅKANSBO JERNBERG är beläget på Håkansbo
egor i Öster Leufsta socken af Uppsala län.

Första kända inmutning är af den 12 September 1825. Sedan inmutades grufvan den 3 November 1840 och lades utmål den 13 Oktober 1851.

Utmålets storlek är 200 famnar i fyrkant. Malmen består af svartmalm i grönskarn och är den omgifvande bergarten leptit.

Malmens sammansättning synes af följande analys.

Kiselsyra	20,22%
Lerjord	4,90"
Jernoxid	46,30"
Jernoxidul	20,83"
Manganoxidul	0,25"
Kalk	5,52"
Magnesia	1,25"
Glödnings förl.	0,84"
Fosforsyra	0,041"
Svafvel	0,310"
Koppar	<u>0,006"</u>
	100,467%

Jern 48,60 %
Mangan 0,19 "
Fosfor 0,019"

Stockholm den 25 Sept. 1913.

Grabe & Petrén.

Grufvan eges af Wigelsbo Grufintressenter.

Nora år 1913.

Gunnar Abrahamson

Beskrifningen mycket knapphändig

G.F.