


KARTA

ÖFVER

GLITTRA GRUFVOR.



Karta

öfver

litttra Grusvor

Gränsbyttrefältet
i Lindes socken och Örebro län,

upprättad på grund af egna mätningar,

som afslutades 2.30 maj 1892

af

K. G. Brunnberg.

Bestilt bekräft. enf. Kongl. Comm. Coll. Pers. d. 27/5 1892


Skala 1:500.

Svartmaln



Begmalit

Blodsten




Granulit

Samplotteringsmätning till denna karta


för tiden		Verkställd af	Inlagd i denna karta		
fr. ömde	till ömde		af	den	
18 ²² / ₃ 92	18 ¹² / ₃ 93	Jh. Dahlblom	Carl Fyggare	18 ²² / ₃ 93	Coll. C. H. M. 6.
18 ¹⁸ / ₃ 93	18 ⁶ / ₃ 94	Jh. Dahlblom	Carl Fyggare	18 ²⁶ / ₁₁ 94	Coll. C. H. M. 6.
18 ⁴ / ₃ 94	18 ²⁵ / ₇ 95	O ^h . Norelius	C. H. Mannesthale	18 ²⁰ / ₁₀ 96.	
18 ²⁵ / ₇ 95	18 ² / ₁₁ 96	O ^h . Norelius	C. H. Mannesthale	18 ⁷ / ₇ 97.	
18 ² / ₁₁ 96	18 ⁸ / ₃ 97.	O ^h . Norelius	C. H. Mannesthale	18 ⁵ / ₃ 98.	
18 ⁸ / ₃ 97	18 ²⁸ / ₁₁ 98	O ^h . Norelius	C. H. Mannesthale	18 ² / ₁₁ 99.	
18 ²⁸ / ₁₁ 98	19 ¹⁶ / ₅ 00	O ^h . Norelius	C. H. Mannesthale	19 ¹² / ₁₂ 00.	
19 ¹⁶ / ₅ 00	19 ¹³ / ₈ 02	O ^h . Norelius	C. H. Mannesthale	19 ²⁷ / ₁₂ 02.	





- A Storgufran
- B Sör - δ_2 -
- C Lill - δ_2 -
- D Ny - δ_2 -





















Fig. 10.



Bvärprofiler



efter

e-f

g-h

a

a




Längdprofiler

efter

a-b

e

e



0.
20.
40.
60.
80.
100.
120.
140.
160.
180.
200.
220.
240.

0.
20.
40.
60.
80.
100.
120.
140.
160.
180.
200.
220.
240.


33

33

33

33

33



Beskrifning till "Karta öfver Glästra grufvor i Linds socken och Örebro län".

Om tiden för Glästra grufvornas inomtände känner
man för närvarande ingenting med visshet. Den 24
juli 1823 erhöles emellertid grufvorna utmål, som re-
glerades af Bergmästar Boer den 27 september 1859.
Efter att i omkring fyra decennier ej hafva varit tomma,
började lussningen derstädes år 1891.

Fyndigheten är belägen i en glimmerrik,
grå granulit på gränsen till en större pegmatitmassa.

Malmen är en koarträndig blodsten af Stribergs-
typen. Dess strykningssiktning är nordnordvästlig, fäll-
stupning 45° åt östsydost samt fällstupning åt sydsydost.
Järnhalten uppgår till 52 à 54% samt fosforhalten till om-
kring 0.007%. I de flesta smälter malmen med glarig slag
vid en beskickning af 15 till 20% kalk. Under det att mala-
men i närliggande Hellblanka grufvor i afsevärd grad
är förorenad af kisel, förekomma dylika härstädes
skäligt sparsamt.

Malmen åtföljande lagerarten utgöres i afse-
värd grad af mörkgrå koarts, beklädd med ljusgrå, fjällig
blodsten. Såsom sprickfylnad antäffas äfven här och här-
epidant.

Från utmålet har brytning på tvärs släta under
år 1892 egt man, nämligen dels i gamla grufvor, som vid
läsningen hade en djup af omkring 40 m, dels i en nord-
ost om denna synligt taget behakt. Malmen i denna har
uteslutande utgjorts af soartmalen, begränsad af pegma-
tit och så upplemdad af denna, att brytningen derstädes
mest upphöra.

I gamla grufvorna norra gärdet har malmen
även blifvit afskuren af en mot sydost brant stupande
pegmatit af ännu okänd mäktighet. Ivid denna pegma-
tit har blodstenen blifvit omgiven af soartmalen, fler-
städes särdeles grofkristallinisk.

Malmfångsten under år 1892 utgjorde 3.690 tun
af 8.000 tun uppfördadt berg, eller cirka 46%.

För berg och vänen uppföring användes vänen-
kraft.

Äyndigheten äges af:

Skjemsfors Intressenter 12/24,

Fulda med. hysie Aktiebolag 9/24 och

Dalkarls hysie Bruksegare 3/24.

Malmen förbrukas vid Skjemsfors Bock, Fulda med. hysie
och Dalkarls hysie masagrar.

Krängesberg den 27 februari 1893.
O. G. Brunnberg.