

Plan- och Profil-Kartor

öfver

Sjö-Grusvorna


Strömsdals Bruks mark i Säfsnäs Socken St. Kopparbergs Län

på grund af egna, den 30 Mars 1886 afslutade mätningar, upprättade af

S. R. Moberg

Ser till behörig ord. Hög. Commerce Collegii beslut af den 8 Januari 1887.

Skala $\frac{1}{800}$





 Magnetisk jernmalm	 Jordlager
 Blodstens malm	 Byggnad
 Svag malm	 Sänkning
 Granulit	 Varp
 Granit	 Löfskog
 Grönskarn	 Barrskog


 Timradt schakt	 Pivot
 Jernväg	 Profilinie
 De på bockar	 Konnektionspunkt
 Konoleddning	 Tollmärkpunkt
 Vändbrott	 Märkpunkt
 Linledning	


Kompletteringsmätning till denna karta


för tiden		Verkställd af	Inlagd å denna karta	
fr. och med	till och med		af	den
18 ³⁰ / ₃ 86	18 ¹⁰ / ₁₀ 87	G. Nauckhoff	C. H. Mannesthale	18 ³⁰ / ₁₁ 88
18 ¹⁰ / ₁₀ 87	18 ¹² / ₁₂ 88	G. Nauckhoff	C. H. Mannesthale	18 ⁷ / ₁₀ 89
18 ¹² / ₁₂ 88	18 ²² / ₂ 90	G. Nauckhoff	C. H. Mannesthale	18 ¹² / ₅ 90
18 ²² / ₂ 90	18 ²¹ / ₁₁ 90	S. R. Wibet	C. H. Mannesthale	18 ²⁰ / ₅ 91
18 ²¹ / ₁₁ 90	18 ¹⁶ / ₁₂ 91	G. Nauckhoff	C. H. Mannesthale	18 ²⁸ / ₇ 92
18 ¹⁶ / ₁₂ 91	18 ²⁶ / ₁₂ 92	K. G. Brunnberg	C. H. Mannesthale	18 ³⁰ / ₅ 93








































Längd~profiler.

Trär~profiler.

efter A B

efter C D

efter 1

efter 2

0 20 40 60 80 100 120 140

0

20

40





60

80

100

120

140



A

A

Beskrifning
till
Kartan
öfver Grufvorna i Låpsnäs socken, Kop.
parbergs län.

Grufvan äges af Grävendals Aktiebolag, på hvars mark hon är belägen.

Hon upptäcktes och inmutades den 22 September 1884 och erhöi utmål den 22 Oktober 1885.

Fyndigheten förekommer egenomligt nog inom en trakt, der en ej malmförande bergart, Tornebohns jingranit, är förherrskande, men hwart dock en obetydlig rest efter sannolikt förrt mäktiga granulitafslagningar anträffas. Dessa hafva antagligen före granitens uppträdande förekommit här. Stådes och vid dennas eruption blifvit inbakade i den smälta massan.

De bägge här förekommande malmlagren äro därför också på flera ställen genomtvärade af gangar af denna granit, hvilka undertundom innesluta mindre brötklycken af malmen eller lagerarter.

I den norra parallelen är malmen magnetisk jernmalmen och i den rödra blodten. Strykningen är öster och vester och stupningen 70° à 80° mot söder. Den bergart, som närmast omgifver malmen, är ljusgrå granulit och de åtföljande lagerarterna hufvudsakligen tack, klorit, magnesiaglimmer, serpentin, jemte något li-

ett af de Prouzitiknande pyroxenmineral.
Malmen, som är enbart gånad, ger circa 50% i 55%
tackjern samt är nästan fri från fosfor och svaf-
vel.

På inga granitgångar märkte genomskjutas, är
malminprocenten 50% i 60%.

För berg och vattenuppföring användes vatten-
kraft.

Grängesberg i April 1890.

Gust. Naukhoff.