


Jordartskartan

12G Avesta NV

Map of the Quaternary Deposits

Skala 1:50 000



2008

KORTFATTAD BESKRIVNING AV JORDARTERNA

I det följande ges en mycket kortfattad beskrivning av jordarterna inom kartområdet 12G Avesta NV. En mer omfattande beskrivning till kartområdet utges separat.

KARTERINGSMETODER

Två olika karteringmetoder har använts inom kartområdet: en noggrannare längs Dalälvens dalgång och i kartområdets centrala delar (metod A) och en betydligt mer översiktlig i övriga områden (metod C), se karta 3. Den noggrannare metoden bygger i huvudsak på omfattande fältarbete, medan den mer översiktliga i väsentlig grad bygger på flygbildstolkning och fältundersökning endast utmed dalgångarna. Differentiering av en del jordarter och detaljprogrannhet är olika i de två karteringmetoderna, se den separata beskrivningen.

JORDARTER SOM BILDATS AV LANDISEN ELLER DESS SMÅLTVATTEN (GLACIALA AVLAGRINGAR)

Större delen av de jordarter som idag täcker berggrunden inom området bildades under slutet av den senaste iselden. Jordarterna bildades vid inlandsisens randzon och i det smältvatten som frigjordes då isen smälte för ca 10 800 år sedan. Större delen av kartområdet ligger under nivån för högsta kustlinjen (HK). Höjdområdena omkring Garpenberg, de högsta topparna i sydväst samt Bispbergs klack och angriparande berg när över HK. Efter landisens avsmältning avsattes sorterade sediment i havet utmed den forna strandzonen samt utmed vattendragen. Även torvmärkerna har bildats efter landisens avsmältning.

Morän

Landisen tog upp och bearbetade lossbrutna delar av berggrunden och äldre jordlager. I samband med isens avsmältning avsattes materialet som en osorterad jordart, morän. Denna bildades dels under isen, dels i isens uppspruckna randzon. Moränen inom kartområdet domineras av sand och har en växlande halt av silt, grus, sten och block (sandig morän). Små områden med lerig respektive grusig morän förekommer. I den sydvästra och nordöstra delen är moränkullar vanligt förekommande. Huvuddelen av moränsens yta är normalblockig. Storblockiga områden förekommer främst i anslutning till moränkullar i den sydvästra delen av kartområdet. I den nordöstra delen finns extremt storblockiga områden öster om Flinsejön.

Isältsavlagringar

Vid landisens avsmältning bildades stora mängder smältvatten. Vattnet samlades i tunnlar och sprickor i isen och sökte sig ut mot isranden. Material som fanns i isen, allfrån block till lerpartiklar, transporterades och sorterades i smältvattnet. Isältsavlagringarna bildades när block, sten, grus och sand avsattes i isens hällgötor eller framför isen. Både i dalbotten, en av Melansveriges största isältsavlagringar, nårvar över kartområdet. Den är ofta ryggformad och omges av djupa dödlagsgrävar och utgör därmed ett markant inslag i landskapsbilden. En betydligt mindre men ändå ryggformad än ansluter till Både i dalbotten, en av Melansveriges största isältsavlagringar, nårvar över kartområdet. Den är ofta ryggformad och omges av djupa dödlagsgrävar och utgör därmed ett markant inslag i landskapsbilden. En betydligt mindre men ändå ryggformad än ansluter till Både i dalbotten, en av Melansveriges största isältsavlagringar, nårvar över kartområdet. Den är ofta ryggformad och omges av djupa dödlagsgrävar och utgör därmed ett markant inslag i landskapsbilden.

Glaciala finkorniga sediment

Under isavsmältningen spreds isälvarens slam i det dåvarande havet och sedimenterade som silt och lera. Vattenföringen växade med årstiderna. Under sommarhalvåret var vattenföringen kraftig och slamttransporten stor. Under vinterhalvåret var sedimentförloren liten. Glacial silt utgörs av ett tjockare sommarskikt dominerat av silt och ett tunnare vinterskikt som kan ha inslag av lera. De centrala delarna av kartområdet domineras av silt och varvigt silt med lerskikt. I de sydöstra och nordöstra delarna dominerar den glaciala lera.

JORDARTER SOM BILDATS EFTER LANDISENS AVSMÄLTNING (POSTGLACIALA AVLAGRINGAR)

Under landhöjningen utsattes tidigare avsatta jordlager för vågornas påverkan (svallning) varvid en viss omlagring av de ylligare jordlagen skedde. De utsvallda partiklarna avlagrades utanför stranderna som svallgrus och svalland. En viss omlagring av de ylligare delarna av de redan avsatta finkorniga sedimenten skedde också. I sjöarna och lokalt längs kusten avsattes gyttja och gyttjerna som sluttigen täcktes av torv och bildade torvmärken. Många torvmärken har också bildats genom försumpning av fastmark.

Svallsediment

Svallsedimenten inom kartområdet förekommer dels i anslutning till den stora åsen och dels på sluttningar och i dalgångar strax under högsta kustlinjen.

Älv- och svallsediment

Älvsediment har avsatts utmed rinnande vatten och i deltan vid vattendragens mynnig i sjöar. Älvsediment som fortfarande avsatts under högvattensperioder och som innehåller en betydande andel organiskt material benämns svallsediment. Älv- och svallsediment har stor utbredning längs Dalälven. De domineras av finnsand och grovsilt. Där Dalälven mynnar i sjön Hävan finns ett stort delta där sedimentation pågår i dag.

Torv


Torvmärkerna bildades och bildas fortfarande genom försumpning av fastmark eller igenväxning av tidigare sjöar. Torvjordar består av mer eller mindre föruttnade växtdelar som bevarats i fuktigt miljö.

JORDARTSANALYSER

I samband med kartläggningen har tagits prover av olika jordarter. Ett antal analyser har gjorts på proven, bl.a. har konstorleksammansättning bestämts. På vissa prov har även kalkhalt och organisk halt analyserats. Analyseresultatet presenteras i den separata beskrivningen.

1. BERGGRUND
BEDROCK


Berggrunden i kartområdet 12G Avesta NV består till största delen av djupbergarter. Ybergarter, som bildats på jorstan, är de äldsta bergarterna i området (ca 1900 miljoner år). De domineras av sura (kvartsriska) vulkaniska bildningar. Underordnat finns basiska (rika på mörka mineral) vulkaniter och sedimentära bergarter, inkl. kristallin kalksten. Ybergarterna intruderades av djupbergarter (bildade i jordskorpen), granitoider och basiska bergarter, för ca 1600 miljoner år sedan. Alla ovan nämnda bergarter omvandlades och deformades (metamorfoserades) för ca 1800 miljoner år sedan och har därför prefixet "meta-" före sina namn. I samband med och strax efter metamorfosen intruderade graniter den metamorfa berggrunden. Senare intruderades berggrunden av diabasgångar.



Granit
Gneiss
Metagranitoid
Metagabbro
Metabasalt
Metabasic rock
Metamorf kalksten, marmor
Amfibol
Sur metavulkanit
Acid metavulkanit
Basisk metavulkanit
Basic metavulkanit
Metasedimentär bergart
Metasedimentary rock

2. TOPOGRAFI, ISRÖRELSER & HÖGSTA KUSTLINJEN
TOPOGRAPHY, ICE MOVEMENTS & HIGHEST COASTLINE


Kartan visar en topografisk skuggning och färgkodning av området, där rött representerar högre liggande områden och grönt lägre. Den topografiska modellen bygger på Lantmäteriets digitala 50 m höjddatabas. Rälflor bildades då inlandsisen rörde sig över området och block och stenar som fanns i isens under del repade berget. Rälflornas rikning visar att isen i nedre delen slutade röra sig i stort sett från nordnordväst mot sydost. I kartbladets beskrivningen avsnitt om isströflor och isrörelser beskrivs isrörelsen mer i detalj.



Rälflor
Glacial striae
Isältsavlagring
Glaciofluvial deposit
Område under högsta kustlinjen
Area below the highest coastline


3. KARTANS NOGGRANNHET
MAP ACCURACY

Inom de grönmärkade områdena, där omfattande fältkontroller utförts, är lägesnoggrannhet av ca 50 m eftersträvd. Inom övriga områden, där kartan i huvudsak grundas på flygbildstolkning, är kartbliden mer översiktlig och noggrannheten lägre. För mer information om kartläggningsmetod hänvisas till den separata kartbladsbeskrivningen.



Detaljerad kartläggning (lokal nivå, metod A)
Detail mapping (local level, method A)
Översiktlig kartläggning (regional nivå, metod C)
Overview mapping (regional level, method C)

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING



Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besöks Vår Västergatan 18
SE-751 20 Uppsala, Sweden
Tel: +46(0) 18 17 80 00
Fax: +46(0) 18 17 80 10
E-post: sgu@sgu.se
URL: http://www.sgu.se

Filialkontor/Regional Offices:
Göteborgsregionen
Guthrievägen 54
SE-413 20 Göteborg, Sweden
Tel: +46(0) 31 708 30 50
Fax: +46(0) 31 708 30 15
E-post: gbg@sgu.se

Kilingsregionen
SE-223 50 Lund, Sweden
Tel: +46(0) 46 31 17 70
Fax: +46(0) 46 31 17 80
E-post: lnd@sgu.se

Skogstagen
SE-707 70 Malmö, Sweden
Tel: +46(0) 402 348 00
Fax: +46(0) 402 316 14
E-post: mmo@sgu.se

Box 16247
SE-103 24 Stockholm, Sweden
Tel: +46(0) 8 545 215 00
Fax: +46(0) 8 54 48 14
E-post: stock@sgu.se

© Sveriges geologiska undersökning (SGU), 2008

Medgivande behövs från SGU för varje form av mångfaldigande eller återgivning av denna karta. Detta innefattar inte bara kopiering utan även digitalisering eller översättning till annat medium.

Skala 1:50 000

0 1 2 3 4 5 km

TECKENFÖRKLARING

Jordarterna är i teckenförklaringen grupperade efter bildningsstilt. De är i princip placerade så att en yngre jordartsgrupp står ovanför en äldre. Monster utan ram, t.ex. för tunt yllager av torv, redovisas i kombination med jordartsbezeichnung. Inom varje grupp är, utan hänsyn tagen till ålder, den mest finkorniga jordarten placerad ovanför och den mest grovkorniga undanför. De äldsta jordarterna – moränerna – blir normalt direkt på berg. Övriga jordarter utbreddas antingen av berg eller ett eller flera äldre jordlager. Kartan ger en översiktlig bild av jordarternas utbredning nära markytan samt visar ett urval landformer. I en del fall redovisas, mycket översiktligt, även underliggande jordart samt tunna yllager av annan jordart. Asterisk (*) framför låda visar att bezeichnung används inom översiktligt kartat område, se karta 3.

Mosse, t.v., klär, t.h.
Bog, left, top, right
Gyttja
Gytja
Torv
Peat
Tunt yllager av torv
Thin peat cover
Aktiv erosionsbrant, t.ex. ripa
CRR with active erosion
Skredrätt
Landslide scar
Ravin
Gully
Svallsediment: lera-silt, t.v., sand, t.h.
Young fluvial sediment: clay to silt, left, sand, right
Älvsediment: grovsilt-finsand, t.v., sand, t.h.
Old fluvial sediment: coarse silt to fine sand, left, sand, right
Flygsand
Aeolian sand
Gyttjeler
Gytja clay
Postglacial lera
Postglacial clay
Postglacial sand
Postglacial sand
Svällgrus
Postglacial gravel
Klapper
Shingle
Tunt eller osammanhängande yllager av postglacial sand-grus
Thin or discontinuous cover of postglacial sand-gravel
Högsta kustlinjen, t.v., strandvall, t.h.
Highest coastline, left, beach ridge, right
Glacial silt, t.v., glacial varvigt silt med lerskikt, t.h.
Glacial silt, left, varved glacial silt, right
Glacial lera
Glacial clay
Tunt eller osammanhängande yllager av lera-silt
Thin or discontinuous cover of clay-silt
Isälvsediment, t.v., dito med tydlig ryggform, t.h.
Glaciofluvial sediment, left, ditto, with distinct ridge-shape, right
Isälvsediment, t.v., glacial grovsilt-finsand, t.h.
Glaciofluvial sand, left, glacial coarse silt to fine sand, right
Smal isältsavlagring
Narrow glaciofluvial deposit
Morän, huvudsakligen sandig
Till, mainly sandy
Moränrygg, t.v., drumlin, t.h.
Moräne ridge, left, drumlin, right
Dödlagsgröpp
Kettle hole
Enskilda stora block, t.v., blockskänka, t.h.
Isolated large boulders, left, boulder depression, right
Kullig morän
Hummocky moraine
Svallad yta
Wave-washed surface layer

Moräns blockhalt i ytan
The boulder frequency of the till surface
Storblockig
High frequency of large boulders
Blockig
High boulder frequency
Hög blockfrekvens på annan jordart än morän
High boulder frequency on other deposit than till
Berg, t.v., tunt eller osammanhängande jordfäcke på berg, t.h.
Bedrock, left, thin or discontinuous soil cover on bedrock, right
Berg liten blockning, t.v., lågblockig blockning, t.h.
Bedrock: small exposure, left, elongate exposure, right

Stenbrott
Quarry
Källa
Spring
Isrälflor
Glacial striae

Måttighetsuppgifter i meter
Thickness in metres of Quaternary deposits


• 2T
Peat
• 4K
Kohesionsjordarter (lera, silt och gyttja)
Cohesive sediment (clay, silt, and gyttja)
• 2F
Frikationsjordarter (sand och grus)
Non-cohesive sediment (sand and gravel)
• 2M
Morän
Till
• 2M
Understrukna uppgifter innebär att bormingen nått berggrunden
Underlining means that the boring has reached the bedrock

Gruslag, dagbrott o.d.
Gravel pit, quarry etc.

Fyllning
Artificial fill

Gräns mellan detaljerad och översiktlig kartläggning, se även karta 3
Boundary between detailed mapping and overview mapping, cf. map 3

Schematisk profil som visar normala jordlagerföljder inom kartområdet.
Typical section through Quaternary deposits in the map area.



Den geologiska karteringen påbörjades 1984–1995 och slutfördes 2002–2003 under ledning av Karin Grönås. Kartans geologiska information finns digitalt lagrad vid SGU.
Kartans geologiska information finns digitalt lagrad vid SGU.
Referens till karten: Grönås, K. & Freden, C., 2008. Jordartskartan 12G Avesta NV, skala 1:50 000. Sveriges geologiska undersökning K 112.
Reference to the map: Grönås, K. & Freden, C., 2008. Map of the Quaternary Deposits 12G Avesta NV, scale 1:50 000. Sveriges geologiska undersökning K 112.
ISBN 1665-8330
ISBN 978-91-7158-829-6

SGU serie K 112
JORDARTSKARTAN
12G AVESTA NV