


Jordartskartan

13F Falun SV

Map of the Quaternary Deposits

Skala 1:50 000



2008

KORTFATTAD BESKRIVNING AV JORDARTERNA

I det följande ges en mycket kortfattad beskrivning av jordarterna inom kartområdet 13F Falun SV. En mer omfattande beskrivning till kartområdet utges separat.

KARTERINGSMETODER

Två olika karteringsmetoder har använts inom kartområdet: en noggrannare längs Dalälvens dalgång (metod A) och en betydligt mer översiktlig i övriga områden (metod C), se karta 3. Den noggrannare metoden bygger i huvudsak på omfattande fältarbete, medan den mer översiktliga i väsentlig grad bygger på flygbildstolkning och fältundersökning endast utmed bäckarna. Differentiering av en del jordarter och detaljprogrammet är också i de två karteringsmetoderna, se teckenförklaringen och den separata beskrivningen.

JORDARTER SOM BILDATS AV LANDISEN ELLER DESS SMÄLTVATTEN (GLACIALA AVLAGRINGAR)

Större delen av de jordarter som idag täcker berggrunden inom området bildades under slutet av den senaste istiden. Jordarterna bildades vid inlandisens randzon och i det smältvatten som frigjordes då den smälte för ca 10 000 år sedan. Dalälvens dalgång och kartans sydöstligaste del ligger under rivån för högsta kustlinjen. Efter landisens avsmältning avsattes sorterade sediment i havet utmed den forna strandzonen samt utmed vattendragen. Även torvmärkena har bildats efter landisens avsmältning.

Morän

Landens top och bearbetade lössarutna delar av berggrunden och äldre jordlager i samband med isens avsmältning avsattes materialet som en osorterad jordart, morän. Denna bildades dels under isen, dels i isens uppspruckna randzon. Moränen inom kartområdet domineras av sand och har en växlande halt av silt, grus, sten och block (sändig morän). Den är ofta grusig i anslutning till kullig morän. Kornstorleksammansättningen och blockhalten varierar beroende bl.a. på bergartsinnehåll, transportsträcka och ev. inblandning av äldre jordlager. Huvuddelen av moränsens yta är normalblockig.

Isälvsavlagringar

Vid landisens avsmältning bildades stora mängder smältvatten. Vattnet samlades i tunnlår och sprickor i isen och sökte sig ut mot landens. Material såsom block, grus, sand, sten, grus och sand avsattes i isens håligheter eller framför isen. Kartområdets isälvsavlagringar är koncentrerade till Badelundsdäsen och längs Österdalälvens och Dalälvens dalgång. Relativt miktiga fäsediment (lera och silt) täcker delvis isälvsedimenten vid Gagnef och Djurås (särskild beteckning på kartan).

Glaciala finkorniga sediment

Under isavsmältningen spreds isälvsarnas slam i det dåvarande havet och sedimenterade som silt och lera. Vattenföringen växade med årliderna. Under sommarhalvåret var vattenföringen kraftig och slamttransporten stor. Under vinterhalvåret var sedimenttillförseln liten. Glacial silt utgjorde ett tydligt sommarskikt dominerat av silt och ett tunnare vinterskikt som kan ha inlagit av lera. Den glaciala silten inom kartområdet är varvig men varvigheten saknas vanligen den översta metern eller metrarna.

JORDARTER SOM BILDATS EFTER LANDISENS AVSMÄLTNING (POSTGLACIALA AVLAGRINGAR)

Under landhöjningen utsattes tidigare avsatta jordlager för vågornas påverkan (svallning) varvid en viss omringning av de yttre jordlagren skedde. De utsvallade partiklarna avlagrades utanför stränderna som svallgrus och svallsand. En viss omringning av de yttre delarna av den redan avsatta silten och leran skedde också. I sjöarna och lokalt längs kusten avsattes gyttja och gyttjeler som slutligen täcktes av torv och bildade torvmärken. Många torvmärken har också bildats genom försmupning av fastmark.

Svallsediment

Inom kartområdet finns endast småre avlagringar av svallsediment. De utgjorde av sand, som återfinns i anslutning till en del isälvsavlagringar och nedanför moränslutningar.

Vindavlagringar

Vindavlagringar utgjordes främst av flygsand (mellansand-finsand). Den avsattes i regel som kullar eller ryggar, s.k. dyner. Yttlaget av de sandiga isälvsedimenten norr om Gagnef samt vid Djurmo och Linnheden har omgäts av vinden till dyner och kullar.

Älv- och svämsediment

Älv- och svämsediment har avsatts utmed rinnande vatten inom periodvis översvämmade områden. De förstnämnda sedimenten är äldre, medan de yngre svämsedimenten lokalt fortfarande avsatts under högvattensperioder. Sammansättningen varierar från lera till sand och svämsedimenten har en betydande inblandning av organiskt material.

Torv



Torvmärkena bildades och bildas fortfarande genom försmupning av fastmark eller igenväxning av tidigare sjöar. Torvjordar består av mer eller mindre förutlunda växtdelar som bevarats i fuktig miljö.

JORDARTSANALYSER



I samband med kartläggningen har tagits prover av olika jordarter. Ett antal analyser har gjorts på proverna, bl.a. har kornstorleksammansättning bestämts. På vissa prov har även kalkhalt och organisk halt analyserats. Analyseresultaten presenteras i den separata beskrivningen.

1. BERGGRUND
BEDROCK



Berggrunden i kartområdet 13F Falun SV domineras av djupbergarter (bildade i jordskorpan) och underordnad förekommer ybergarter (bildade på jordytan). Ybergarterna, som är ca 1200 miljoner år gamla, domineras av sura (kvartsrika) vulkaniter, men det finns också basiska (rika på mörka mineral) vulkaniter och sedimentära bildningar. Ybergarterna intruderades för ca 1890 miljoner år sedan av basiska och granitoida djupbergarter. Berggrunden omvandlades och deformades (metamorfoserades) för ca 1800 miljoner år sedan, och bergarterna har därför prefixet "meta-" före sina namn. För ca 1800, 1700 och 1500 miljoner år sedan intruderades graniter den metamorfa berggrunden och för ca 1470 och 1260 miljoner år sedan intruderades berggrunden av gångbergarter (diabas och porfyr).

3. HÖJDFÖRHÅLLANDEN OCH ISRÄFFLOR
TOPOGRAPHY AND GLACIAL STRIAE


Kartan visar områdets relief med belysning från nordväst, absoluta höjder samt räffelriktningar. Den topografiska modellen bygger på Lantmäteriets digitala 50 m höjddatabas. Räfflor bildades då inlandisen rörde sig över området och block och stenar som fanns i isens under del repade berget. Räfflornas riktning visar att isen i nedsläningens slutskede rörde sig i stort sett från nordost mot sydväst.

3. KARTANS NOGGRANNHET
MAP ACCURACY

Inom de grönmärkade områdena, där omfattande fältkontroller utförts, har en lägesnoggrannhet av ca 50 m eftersträvas. Inom övriga områden, där kartan i huvudsak grundas på flygbildstolkning, är kartbilden mer översiktlig och noggrannheten lägre. För mer information om kartläggningsmetod hänvisas till den separata kartbudsbeskrivningen.



SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING



Huvudkontor/Head Office:
Box 700
S-701 88 Uppsala, Sweden
Tel: +46(0) 18 77 90 30
Fax: +46(0) 18 77 90 75
E-post: ghu@sgu.se
URL: http://www.sgu.se

Fälkontor/Regional Offices:
Gävleborgsregionen
SE-413 20 Gäddede, Sweden
Tel: +46(0) 31 708 26 50
Fax: +46(0) 31 708 26 75
E-post: ghu@sgu.se
URL: http://www.sgu.se

Kilbucksgatan 10
SE-223 20 Lund, Sweden
Tel: +46(0) 46 31 17 11
Fax: +46(0) 46 31 17 99
E-post: lund@sgu.se

Skolgatan 4
SE-205 70 Malmö, Sweden
Tel: +46(0) 40 333 340 00
Fax: +46(0) 40 333 316 06
E-post: mmc@sgu.se

Box 10347
SE-103 34 Stockholm, Sweden
Tel: +46(0) 8 542 215 00
Fax: +46(0) 8 54 68 14
E-post: stockholm@sgu.se

© Sveriges geologiska undersökning (SGU), 2008



Medgivande behövs från SGU för varje form av mångfaldigande eller återgivande av denna karta. Detta innefattar inte bara kopiering utan även digitalisering eller överföring till annat medium.

0 1 2 3 4 5 km


Skala 1:50 000

TECKENFÖRKLARING

Jordarterna är i teckenförklaringen grupperade efter bildningsstadiet. De är i princip placerade så att en yngre jordartsgrupp står ovanför en äldre. Mönster utan ram, t.ex. för tunt yttigt av torv, redovisas i kombination med jordartsbeteckning. Inom varje grupp är, utan hänsyn tagen till ålder, den mest finkorniga jordarten placerad överst och den mest grovkorniga underst. De äldsta jordarterna – moränerna – visas normalt direkt på berg. Övriga jordarter underlagras antingen av berg eller eller flera äldre jordlager. Kartan ger en översiktlig bild av jordarternas utbredning nära markytan samt visar ett urval landformer. I en del fall redovisas, mycket översiktligt, även underliggande jordart samt tunna yttigt av annan jordart. Asterisk (*) framför låda visar att beteckningen använts inom översiktligt kartat område, se karta 3.

Måtkthetsuppgifter i meter
Thickness in metres of Quaternary deposits

Schematisk profil som visar normala jordlagerföljder inom kartområdet.
Typical section through Quaternary deposits in the map area.



Den geologiska karteringen har utförts 2002-2005 under ledning av Anders G. Lindén och Jonas Ising. Kartans geologiska information finns digitalt lagrad vid SGU.

Referens till karta: Grönås, K. & Ising, J., 2008. Jordartskartan 13F Falun SV, skala 1:50 000. Sveriges geologiska undersökning A 99.
Referens till karta: Grönås, K. & Ising, J., 2008. Map of the Quaternary Deposits 13F Falun SV, scale 1:50 000. Sveriges geologiska undersökning K 99.

Geografiska längden är skedd från Greenwich, Gauss' projection.

Utskott från Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet 1996-10-30.

ISSN 1652-8338
ISSN 078-91-7158-816-6

Topografiskt underlag: Ulf OSD - Terrängkartan
Geografiska längden är skedd från Greenwich, Gauss' projection.

Utskott från Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet 1996-10-30.

ISSN 1652-8338
ISSN 078-91-7158-816-6

Tryck: Tabergs Tryckeri AB, Taberg 2008